

Aus dem Botanischen Garten der Universität Breslau.

Beiträge zur Blattanatomie der Cupressineen.

Inaugural-Dissertation

veröffentlicht

mit Genehmigung der Hohen philosophischen Fakultät
der Königl. Universität Breslau

von

Alfred Prause


Freitag, den 16. Juli 1909, vormittags 11 $\frac{1}{2}$ Uhr
im Musiksaal der Universität

Vortrag:

Die geschichtliche Entwicklung der Lehre
von der Sexualität bei den Kryptogamen
und Promotion.

Breslau 1909.

Druck von Wilh. Gottl. Korn



Gedruckt mit Genehmigung der hohen philosophischen
Fakultät der Königl. Universität Breslau.

Referent: Prof. Dr. *F. Pax*.

Tag der mündlichen Prüfung: 23. Juni 1909.

Meinen lieben Eltern.

Die anatomischen Eigenschaften der Cupressineen haben systematisch noch keine Verwendung in weiterem Umfange gefunden. Dies mag dem Umstande zuzuschreiben sein, daß eine Gruppe, welche in ihren Vegetationsorganen so einheitlich gebaut erscheint, auch anatomisch größere Verschiedenheiten nicht versprach. Wenn man dagegen das große Areal der Cupressineen berücksichtigt, das in seinen einzelnen Teilen recht verschiedene klimatische Bedingungen der Pflanzenwelt bietet, so dürfte eine derartige Untersuchung doch nicht so ganz aussichtslos sein. Auch die Frage, inwieweit die Retinisporaformen im anatomischen Bau sich mit den Altersblättern decken, bedarf noch einer Klarstellung.

I. Anatomie des Cupressineenblattes.

A. Die Gewebesysteme.

Bei der folgenden Untersuchung wurden vorzugsweise die durch begrenzte Wachstumsdauer ausgezeichneten Kurztriebe berücksichtigt. Diese stehen den durch unbegrenztes Dicken- und Längenwachstum, also starke axiale Entwicklung zeigenden Langtrieben gegenüber.

Der Bau der Zweige ist radiär oder bilateral. Demgemäß sind die Blätter bei ersteren sämtlich von gleicher Form, bei letzteren wenigstens die eines Wirtels.

Sämtliche Arten der Gattungen *Thuya*, *Thuyopsis*, *Chamaecyparis*, sowie aus der Gattung *Libocedrus* die in unseren Gartenanlagen häufig kultivierte *L. decurrens* zeigen einen ausgesprochen dorsiventralen Bau der Sprosse. Sie tragen zwei verschiedene Wirtelformen. Die

Blätter des einen Quirls sind flach und der Achse angepreßt, während die des anderen kahnförmig gebogen sind. Die Ebene, welche die morphologische Ober- und Unterseite trennt, geht durch die Mediane der beiden Kantenblätter, so daß das eine Flächenblatt der Oberseite, das andere der Unterseite angehört. Nur an den Kurztrieben zeigen jedoch die dorsiventralen Cupressineen die erwähnte morphologische Differenzierung. Ihre Langtriebe sind immer radiär gebaut, ebenso wie die der bilateralen Arten.

Mit dieser morphologischen Gliederung hängt der anatomische Bau des Blattes innig zusammen.

Die Blätter der Langtriebe zeigen einen viel einfacheren Bau.

I. Das Hautsystem.

Die Epidermis besteht aus einer einfachen Schicht in der Längsrichtung des Blattes gestreckter Zellen. Ihre Form weicht von der anderer Coniferen im allgemeinen nicht ab, wie schon *Thomas*¹⁾ hervorhebt. Die radialen Wände zeigen auch bei den von *Klemm*²⁾ noch nicht untersuchten Arten Tüpfel, welche mit denen der benachbarten Zelle korrespondieren. Alle Epidermiszellen besitzen an der Außenwand eine mehr oder minder dicke Cuticula mit dreifacher Schichtung.

Die zuerst von *Thomas*³⁾ falsch gedeuteten, von *Solms-Laubach*⁴⁾ näher bei *Juniperus*arten, *Libocedrus Doniana* und *Thuja orientalis* untersuchten Einlagerungen von Kalkoxalat sind bei allen Cupressineen vorhanden. Die Krystalle liegen immer direkt in der Cuticula nahe der Oberfläche, während sie in den Cuticularschichten fehlen. Ihre Größe auch bei den Arten, wo sie am stärksten ausgebildet sind (*Libocedrus Doniana*), überschreitet nicht

¹⁾ *F. Thomas*, Zur vergl. Anat. der Coniferen-Laubblätter. Pringsheims Jahrb. IV. p. 25.

²⁾ *P. Klemm*, Über den Bau der beblätterten Zweige d. Cupressineen. Pringsheims Jahrb. 17. p. 506.

³⁾ *Thomas* l. c. p. 27.

⁴⁾ *H. Solms-Laubach*, Über einige geformte Vorkommnisse oxalsauren Kalkes in lebenden Zellmembranen. Bot. Ztg. 1871. p. 509.

2 μ . Die Größe der Epidermiszellen schwankt erheblich. Ihre größte Länge erreichen sie auf der Unterseite der Nadelblätter, welche eine Mittelrippe ausbilden. Während sie einerseits im allgemeinen nicht mehr als 150 μ lang werden, gehen sie andererseits bis zu einer Minimalgrenze von nur 36 μ bei *Fitzroya patagonica* herab. Die Gattungen *Callitris* und *Thuya* zeichnen sich durch kleine Epidermiszellen aus mit einer Länge von 50 μ . Nur bei *Callitris natalensis* werden sie 200 μ lang. Die tangentielle Breite ist gewöhnlich der fünfte bis sechste Teil der Länge.

Die Cuticula erreicht in ihrer Dicke ein Maximum von 20 μ , was bei der Gattung *Actinostrobus* konstant wird, in den übrigen Gattungen aber sehr schwankt. Bei allen Vertretern der Gattung *Thuya* geht die Dicke auf das Minimum von 5 μ herab.

Die Cupressineen haben mit den Abietineen das Auftreten eines wachartigen Überzuges gemeinsam, der bei allen untersuchten Arten festgestellt wurde. An Herbar-exemplaren entzieht sich dieser leicht der Beobachtung, läßt sich aber gegenüber den Angaben *Klemms*¹⁾ doch überall nachweisen. Die Wachsschicht ist von zahlreichen Sprüngen durchsetzt, durchsichtig, rissig, spröde und läßt die Schließzellen der Spaltöffnungen frei.

Endlich zeigen jene Stellen, wo Teile der Blätter übereinander greifen, eine Vorwölbung der Epidermiszellen mit ihrer Cuticula, besonders dort, wo Flächen- und Kantenblätter einander decken und zugleich die Spaltöffnungen liegen. Sie scheinen den Zweck zu haben, ein Zusammenpressen der Blätter zu verhindern, um den Luftzutritt in das Innere zu ermöglichen.

Nur bei *Callitris quadrivalvis* und *C. robusta* wachsen diese Verdickungen zu haarartigen Bildungen aus, die schon *Klemm*²⁾ für letztere festgestellt hatte. Die 30 μ langen Haare greifen zahnartig ineinander.

¹⁾ *Klemm*, l. c. p. 505.

²⁾ *P. Klemm*, l. c. p. 505.

II. Das Assimilationssystem.

Das Mesophyll der Blätter gliedert sich in palisadenartig ausgebildetes Assimilationsparenchym, Zuleitungsparenchym und Ableitungsparenchym. Nach der Spitze der Blätter zu verschwindet das Zuleitungsparenchym, da hier der Abstand zwischen Epidermis und Leitbündel sich verringert. Die Palisadenzellen sind in Kurven zur Oberfläche des Organes orientiert und treffen rechtwinkelig auf das Ableitungsparenchym. In der Blattbasis verschwindet diese Differenzierung, und an seine Stelle tritt ein Gewebe runder, chlorophyllärmerer Zellen, welches auch den Langtrieben zukommt. Das Palisadenparenchym liegt immer auf der morphologischen Unterseite und ist bald stärker bald schwächer entwickelt. Diese Tatsache erklärt sich bei den schuppenförmigen Blättern aus ihrer Orientierung gegen das einfallende Licht. Bei den nadelförmigen Blättern, besonders den Arten der Sektion *Oxycedrus*, die nur solche ausbilden, stellen sich die Zweige meist horizontal, so daß auch hier die Unterseite von der Sonne bestrahlt wird. An den seitlichen Kanten greift die Palisadenschicht am Rande auch auf die Oberseite über.

Bei *Juniperus* Sekt. *Oxycedrus* und jenen Arten von *Juniperus*, welche zwei Spaltöffnungsbänder besitzen, aber auch oft bei anderen, treten über dem Streifen in der Mitte der Oberseite chlorophyllarme Zellen palisadenartig auf, welche gewöhnlich bis an das Gefäßbündel heranreichen.

Die Zellen des Palisadenparenchyms haben lange, zylinderförmige Gestalt. Ihr Chlorophyllgehalt und ihre Länge ist immer an der günstiger beleuchteten Seite stärker entwickelt. So weisen die Blätter eines Quirls bei den bilateralen Cupressineen immer ein an Chlorophyllgehalt aber auch an Zahl der Schichten verschiedenes Palisadenparenchym auf.

Das Zuleitungsparenchym zeigt immer bei radialer Anordnung weite Intercellularräume, weniger Chlorophyllgehalt und ist oft von chlorophyllarmen Zellen besonders bei den Gattungen *Cupressus* und *Chamaecyparis*

durchsetzt. Die Länge der Zellen des Zuleitungsgewebes weicht nicht wesentlich von der des Palisadenparenchyms ab. Nur bei *Juniperus oxycedrus* sind sie in Form und Größe verschieden, isodiametrisch.

Das Ableitungsgewebe tritt immer in Gestalt einer Scheide in der Länge des Blattes gestreckter Zellen auf. Lückenlos umschließt diese Scheide das Gefäßbündel und den Tracheidensaum und folgt ersterem in den Stamm hinab, um sich mit denen der anderen Blätter zu einem Ableitungssystem zu vereinigen.

III. Das Durchlüftungssystem.

Als Schwammparenchym funktionieren die durch große Intercellularräume unterbrochenen Zellen des Zuleitungsgewebes. Zur Ausbildung eines ausgesprochenen Schwammparenchyms kommt es nicht, da die Transpiration stark eingeschränkt ist. Die meisten Arten der Cupressineen tragen Schuppenblätter, bei denen die Spaltöffnungen auf der Oberseite des abstehenden Blatteiles sich entwickeln. Diese ist räumlich so klein, daß nicht wenige sogar auf der Seite des Palisadenparenchyms noch solche ausbilden.

Die Spaltöffnungen sind in ihrer Gestalt und Entwicklung eingehend untersucht worden. Ich verweise auf die Arbeiten von *Mahlert*¹⁾ und *Strübing*²⁾. Was ihre Lage anbetrifft, so kann man wohl im allgemeinen die Arten der Gattung *Juniperus* von allen übrigen trennen durch die ausgesprochene Anordnung der Spaltöffnungen in Längsreihen, wobei immer die Längsachse des Spaltes parallel zur Länge des Blattes gerichtet ist. Bei allen übrigen liegen sie in den verschiedensten Winkeln dazu. Wenn nun *Mahlert*³⁾ das letzte Moment benützt, um die Cupressineen

¹⁾ A. *Mahlert*, Beiträge zur Kenntnis des Laubbl. der Coniferen mit besonderer Berücksichtigung des Spaltöffnungsapparates. Bot. Centralblatt XXIV. p. 55.

²⁾ O. *Strübing*, Die Verteilung der Spaltöffnungen bei Coniferen. Diss. Königsberg 1888. p. 6.

³⁾ A. *Mahlert*, l. c. p. 118.

von den übrigen Coniferen zu trennen, so ist dies für *Juniperus* nicht richtig, abgesehen davon, daß auch die nadelförmigen Jugendblätter dem Gesetze nicht folgen. Die Größe der Spaltöffnungen, welche für jede Art gemessen wurde in Länge und Breite, ist nur sehr wenig schwankend. Die Grenzen liegen in der Länge zwischen $60\ \mu$ und $30\ \mu$, in der Breite zwischen $40\ \mu$ und $20\ \mu$. Mit den übrigen Coniferen teilen die Cupressineen den Besitz einer großen, äußeren Atemhöhle. Die Schließzellen sind unter die Oberhaut eingesenkt und mit Ausnahme eines Zellulosestreifens immer verholzt.

Früher wurde schon hervorgehoben, daß die Epidermiszellen an jenen Stellen des Blattes, an denen ein Übergreifen des nächstunteren geschieht, eine papillenartige Vorwölbung zeigen. Treten an diesen Stellen Spaltöffnungen auf, so erhalten sie dadurch einen erhöhten Ringwall.

Eine besondere Eigentümlichkeit ist das Auftreten eines schon äußerlich sichtbaren, körnigen Wachsüberzuges, der die Atemhöhle ausfüllt. Der erste, welcher dies beobachtete war *Link*¹⁾. *Wilhelm*²⁾ stellte diesen Überzug für eine große Anzahl Cupressineen fest. Nach *Wulff*³⁾ wird das verstopfende Wachs, ähnlich der die Epidermis überziehenden, schon früher erwähnten Schicht, von den die Atemhöhle begrenzenden Zellen ausgeschieden. Durch diesen Wachspfropf wird ein Verschluß der Spalte bewirkt, der ein Verstopfen durch Regen oder Wasser verhindert, aber auch die Kommunikation der Interzellularräume mit der Außenwelt erschwert. Auch die Spaltöffnungen an den Stellen des Blattes, wo eine Deckung durch das tiefer stehende erfolgt, besitzen solche Wachspfröpfe. Die innere Atemhöhle entbehrt stets dieser Ausscheidung.

¹⁾ *Link*, Über die Familie Pinus und die europäischen Arten derselben. Abh. d. königl. Berl. Akademie. (1827.) p. 158.

²⁾ *K. Wilhelm*, Über eine Eigentümlichkeit der Spaltöffnungen bei Coniferen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. (1883.) Bd. 1. p. 325.

³⁾ *Th. Wulff*, Studien über verstopfte Spaltöffnungen. Österr. bot. Zeitschrift. (1898.) p. 304.

Gehen Spaltöffnungen auf die Assimilationsseite über, so wird durch das Auseinanderweichen zweier Palisadenzellen die Atemhöhle gebildet.

IV. Das Sekretionssystem.

Den Besitz von schizogenen Harzgängen teilen die Cupressineen mit den meisten anderen Coniferen. Ein solcher tritt bei allen Arten mindestens in der Einzahl auf.

Eine einzige Ausnahme bildet *Cupressus Goveniana*. Hier fehlt der Harzgang ziemlich häufig. Sein Auftreten ist bei dieser Art nicht konstant.

Allgemein ist der Harzgang immer zwischen Gefäßbündel und Epidermis ausgebildet. Wir können hier zwei große Gruppen unterscheiden:

1. Der Harzgang liegt direkt unter der Epidermis und wird durch Mesophyllagen von dem Gefäßbündel getrennt, wobei immer die hypodermale Bastschicht unterbrochen wird.
2. Der Harzgang lehnt sich an das Gefäßbündel an und ist durch das Palisadengewebe von der Epidermis getrennt.

Der erste Fall ist der häufigere. Hierher gehören die Arten von *Juniperus*, *Thuja* und *Cupressus*, ausgenommen *Cupressus torulosa*. Den zweiten Typus vertreten die Gattungen *Actinostrobus*, *Callitris*, *Fitzroya*, *Libocedrus*, *Chamaecyparis*, *Thuyopsis* und *Cupressus torulosa*. Beide Fälle sind durch mannigfaltige Übergänge verbunden, indem sich der Harzgang häufig radial so ausdehnt, daß er den ganzen Raum zwischen Gefäßbündel und Epidermis einnimmt. Doch kann man an jüngeren Blättern dann leicht einen der beiden Typen feststellen.

Die Gestalt des Harzganges ist sehr verschieden. Die nadelförmigen Blätter besitzen immer einen langen, engen Gang, dessen Weite oft 4μ kaum übersteigt, und der durch das ganze Blatt hindurchzieht. In den Schuppenblättern ist er flaschenförmig und liegt mit seinem größeren Ende in der Blattbasis. Mit der Spitze nur ragt er in den

oberen, freien Teil des Blattes. Nicht nur bei den verschiedenen Arten, sondern auch in den verschiedenen Blättern einer Spezies schwankt die Gestalt des Harzganges und auch seine Größe. Beide sind abhängig von der Menge des ausgeschiedenen Harzes. Bei *Callitris* und einigen Arten der Gattung *Cupressus* nimmt der Harzbehälter die Form einer kugeligen Drüse an.

Den Innenraum bildet immer eine konzentrische Schicht dünnwandiger Zellen ohne Chlorophyll. Sie sind die Organe, welche das Öl in den Kanal secernieren, wie *Schwabach*¹⁾ gegenüber *Tschirch*²⁾, der diese Fähigkeit der Epithelzellen des Harzganges bestritt, feststellte. Schon beim Entstehen des Sekretbehälters zeigt sich diese Zellschicht, von dem übrigen Gewebe allerdings noch schwer zu unterscheiden, aber dadurch, daß sie einen kleinen Spalt zwischen ihren Elementen trägt, erkennbar von dem übrigen Gewebe. Der kleine Intercellularraum nimmt mit der Menge des gebildeten Sekretes rasch an Größe zu.

Wenn auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das Blatt nur einen median liegenden Harzgang besitzt, somit die Einzahl dieses Sekretbehälters die Regel bildet, so kommt es doch nicht ganz selten vor, daß das Blatt auch mehrere Harzgänge besitzt. Dieser Typus erscheint in mehreren Modifikationen:

1. Der Querschnitt des Blattes zeigt einen medianen und zwei seitliche Harzgänge. Schon *Thomas*³⁾ und *Klemm*⁴⁾ hatten dies Verhalten für *Chamaecyparis nutkaensis*, *Ch. pisifera* und *Ch. obtusa* gefunden. Ich kann als weitere Beispiele *Callitris Balansae* und *Chamaecyparis Lawsoniana* hinzufügen. Insbesondere wird die Gattung *Thuja* durch dieses

¹⁾ *E. Schwabach*, Zur Kenntnis der Harzabscheidungen in Coniferenadeln. Ber. d. deutsch. bot. Ges. (1889) Bd. XVII p. 292.

²⁾ *A. Tschirch*, Über den Ort der Öl- bzw. Harzbildung bei den schizogenen Sekretbehältern. Ber. d. deutsch. bot. Ges. (1893) Bd. XI p. 202.

³⁾ *F. Thomas*, l. c. p. 53.

⁴⁾ *P. Klemm*, l. c. p. 534.

Merkmal charakterisiert; denn nur *Thuya plicata* mit immer nur einem medianen Sekretbehälter macht hier eine Ausnahme.

2. Einige Arten von *Callitris* und *Chamaecyparis*, die später noch erwähnt werden, besitzen gelegentlich nur seitliche Harzgänge. Es fehlt also bei ihnen der median liegende.
3. Bei einer Anzahl von Cupressineen löst sich der mediane Harzgang in zwei übereinander stehende Behälter auf. Dies hatte *Thomas*¹⁾ bei *Thuya occidentalis* gefunden. Es tritt aber oft auch bei *Thuya gigantea* und *Callitris robusta* ein. Hier fehlen also die seitlichen Gänge.
4. *Thuya occidentalis* und *Th. Standishi* besitzen im Blatt außer den zwei median übereinander stehenden Behältern noch zwei seitliche Sekretgänge.

Ein Vergleich der seitlichen mit dem medianen Hauptgange zeigt ohne weiteres die bedeutenderen Dimensionen des letzteren gegenüber den ersteren sowohl in der Länge als in der Breite.

Einige *Juniperus*-Arten zeigen auch einen Harzgang im Stamme, der jedoch nie mit dem des Blattes in Verbindung tritt, obwohl er in der Richtung des herablaufenden Blattes sich fortsetzt. Nur *J. communis* bildet eine Ausnahme. Der Sekretgang des Blattes kommuniziert mit dem des Stammes, wie schon *Tschirch*²⁾ festgestellt hat.

Das Harz tritt besonders in den schuppenförmigen Blättern in die Zellen des Mesophylls aus. Das gelbliche Sekret erfüllt meistens die Scheide des Harzganges. Die alten, fast abgestorbenen Blätter sind immer vollständig durchtränkt damit.

Außer den Harzbehältern sind auch Schleimzellen in den Blättern ausgebildet. Allerdings sind sie auf die Gattung *Thuya* beschränkt. Bei *Th. occidentalis* und

¹⁾ *F. Thomas*, l. c. p. 50.

²⁾ *A. Tschirch*, Angewandte Pflanzenanatomie (1889) p. 488.

plicata sind sie häufiger, bei *Th. gigantea* und *Standishi* nur selten. Sie liegen immer im Zuleitungsgewebe.

V. Das Leitungssystem.

Die Gefäßbündel im Blatte der Kurztriebe bilden schon im ersten Jahre ihr Cambium zu Dauergewebe um und erhalten dadurch eine große Einförmigkeit. Das Xylem besteht aus Querreihen von Tracheiden mit ring- und spiralförmigen Verdickungen. Das Phloem weist konzentrische Schichten von abwechselnd auftretenden Siebröhren, Phloemparenchymzellen und Bastfasern auf. Oft umgibt den Gefäßstrang eine Schicht verdickter Parenchymzellen. Er ist tief in das Mesophyll eingesenkt und entbehrt der feinen Verzweigungen.

Um eine gleichmäßige Abgabe des Wassers an das Mesophyll des Blattes zu erleichtern, wird der sogenannte Tracheidensaum ausgebildet. Auf dem Querschnitt tritt er flügelartig an die beiden Seiten des Xylems heran und springt in das Zuleitungsgewebe ein. In seiner Längsrichtung läuft er parallel mit den Blatträndern. Seine Elemente sind Tracheiden, deren Gestalt innerhalb bestimmter Grenzen schwankt. Je mehr sie sich dem Xylem nähern, werden sie nicht nur länger, sondern versetzen auch ihre Tüpfel an die Radialwände. Je mehr sie sich vom Xylem entfernen, nimmt ihre Länge ab, so daß sie gewöhnlich am Rande nur wenig länger als breit sind. Sie sind dicht geschlossen, in regelmäßigen Längsreihen angeordnet und immer verholzt.

Bei vielen Cupressineen treten im Innern der Zellen des Tracheidensaumes am Rande der Hoftüpfel zapfenartige Fortsätze auf. Auf Grund dieser Verhältnisse lassen sich die Cupressineen in zwei große Gruppen gliedern.

1. In den Zellen des Tracheidensaumes treten nur Hoftüpfel auf. So verhalten sich die Gattungen *Thuya*, *Chamaecyparis*, *Thuyopsis*, *Fitzroya* und *Libocedrus* außer *L. decurrens*.
2. Die Tracheiden zeigen die oben genannten wurmartigen Vorsprünge. So verhalten sich die Gattungen

Cupressus, Juniperus, Actinostrobus, Callitris, ferner Biota orientalis, Libocedrus decurrens. Bei der letzten Art sind sie nur schwach entwickelt. Auch bei der Gattung Cupressus werden sie noch nicht viel größer. Erst die Arten von Juniperus, Actinostrobus, Callitris, sowie Biota orientalis entwickeln die wurmartigen Fortsätze in den Zellen des Tracheidensaumes viel länger und zahlreicher. Oft drei bis vier an Zahl ragen sie vom wallartig erhöhten Rande jedes Hoftüpfels astartig in das Innere vor. An ihrer Spitze verdicken sie sich oft kugelförmig oder biegen sich um. Das Extrem wird bei Callitris quadrivalvis erreicht, wo durch Vereinigung solcher Vorsprünge Querbalken entstehen.

Die von Scheit¹⁾ untersuchte Cupressus thuyoides, welche Hoftüpfel besitzt, gehört nicht zu Cupressus, sondern ist Chamaecyparis sphaeroidea.

Die Bedeutung des oben in seiner Lage beschriebenen Tracheidensamens erblicke ich mit *Haberlandt*²⁾ in einem Ersatz der fehlenden Seitennerven der Blätter. Auch *Lignier*³⁾ sieht im Tracheidensaume den Rest einer alten seitlichen Verzweigung des Gefäßbündels, die bei den Gymnospermen früher existiert hat, während *Worsdell*⁴⁾ die Tracheiden für Parenchymzellen hält, welche zu Leitzellen umgestaltet wurden. *Bernard*⁵⁾ denkt sich die Zellen des Tracheidensaumes aus Tracheiden entstanden, die sich der Aufgabe angepaßt haben, die fehlenden Nervenzweige zu ersetzen. Jedenfalls basieren diese neueren Forscher auf der Annahme *Haberlandts*.

¹⁾ *M. Scheit*, Die Tracheidensäume der Blattbündel der Coniferen. Diss. Jena. (1883.) p. 13.

²⁾ *G. Haberlandt*, Physiolog. Pflanzenanatomie 3. Aufl. (1904) p. 324.

³⁾ Vergl. *Bernard*, Le bois centripète dans les feuilles de Conifères. Beihefte z. Bot. Centralblatt (1904) Bd. 17. p. 244.

⁴⁾ Vergl. *Ch. Bernard*, l. c. p. 248.

⁵⁾ *Ch. Bernard*, l. c. p. 254.

VI. Das mechanische System.

Außer den mechanischen Elementen des Gefäßbündels tritt im Blatte der Cupressineen immer eine subepidermale Bast-*schicht* auf. Sie bildet einen Hohlzylinder, der von den Spaltöffnungen und vom Harzgange unterbrochen wird. An den Blatträndern ist sie meist doppelt, oft auch noch stärker entwickelt. Ihre bis zum Schwinden des Lumens verdickten Zellen sind im Querschnitt rundlich, die Längen $20\ \mu$ ohne erhebliche Schwankungen. In allen Nadeln und bei den Blättern der Gattung *Juniperus* zeigt die Bast-*schicht* die reichste Entwicklung. Sie tritt hier am Rande auch auf die Oberseite über und erscheint oft in der Mitte unter dem von Spaltöffnungen freien Streifen.

Die Bast-*schicht* verschwindet an jenen Stellen, wo die Basis des Blattes von dem darunter stehenden gedeckt wird. An dieser Stelle tritt im Mesophyll Collenchym auf, welches nach *Klemm*¹⁾ die Bast-*schicht* ersetzen soll. Es erfüllt den ganzen Raum zwischen Epidermis und Gefäßbündel, aber es greift auch in das untere Blatt über. Ein mechanischer Schutz ist aber durch das deckende Blatt, welches sich fest anlegt, schon genügend gewährleistet. Das Collenchym scheint eher den Zweck zu haben die Blattspitze des unteren gegen die Basis des oberen Blattes zu pressen.

Eine durch ihre Lage am Rande des Phloems eigentümliche, mechanische Einrichtung sind die dort stehenden Bastzellen. Sie sind charakteristisch für die Gattungen *Juniperus*, *Actinostrobus*, *Callitris* und für *Biota orientalis*. *Klemm*¹⁾ will auch bei Arten anderer Gattungen ähnliche Zellen an jener Stelle gefunden haben. Es sind dies aber Zellen der Parenchymscheide, die das Gefäßbündel oft umgibt, und von denen *Klemm* selbst behauptet, sie treten neben den Bastzellen auf. Letztere sind aber von ersteren im Längsschnitt mit ihren zugespitzten Enden

¹⁾ *P. Klemm*, l. c. p. 507.

¹⁾ *P. Klemm*, l. c. p. 509.

zu unterscheiden. Zudem sind sie meistens verholzt. Ihre Länge schwankt nicht erheblich.

Endlich findet man im Blatte der Cupressineen auch Steinzellen. Bei einigen Arten hatte sie *Klemm* schon beobachtet. In den Blättern von *Juniperus phoenicea* stellte sie *Schröter*¹⁾ fest. Sie wurden noch für *Thuya Standishi* und *Juniperus procera* gefunden. In der Gattung *Juniperus* sind sie sehr stark verdickt und mit Hoftüpfeln versehen. Ganz anders beschaffen sind sie bei *Cupressus Benthami* und *Goveniana*. Ihre Gestalt ist kugelförmig oder wenig in die Länge gezogen, und die Wandung nur sehr schwach verdickt, so daß ein großer innerer Hohlraum entsteht. Bei *Cupressus glauca*, wo *Klemm*²⁾ sie beobachtet hat, wurden sie nicht gefunden. Weiter treten Sklerenchymzellen auf in den Blättern von *Libocedrus tetragona* und *chilensis* und *Callitris iuniperoides* und *rhomboidea*. Ihre Größe erreicht in der ersten Gattung 200 μ in der letzteren das doppelte. Einzig ist die Ausbildung verschieden gestalteter Formen in demselben Blatte. Osteosklereiden und rundliche Steinzellen weist *Fitzroya patagonica* auf und erhält dadurch ein gutes Charakteristikum. Das von *Klemm*²⁾ erwähnte „interparenchymatische Stereom“ wurde bei dieser Art nicht gefunden. Vielmehr liegen die Sklerenchymzellen auch hier vereinzelt im Gewebe. Endlich besitzt noch *Thuya Standishi* Sklereiden.

Die Lage der Steinzellen ist verschieden. Bald fällt ihre Längsachse mit der des Blattes zusammen, bald steht sie senkrecht dazu. Im letzteren Falle bilden sie Querlamellen, welche dem intercellularenreichen Zuleitungsparenchym auf der Oberseite der Blätter Festigkeit gewähren. Im allgemeinen treten sie im Mesophyll besonders gegen die Basis auf, aber auch in der Spitze des Blattes immer zwischen Gefäßbündel und Oberseite.

¹⁾ C. Schröter in O. v. Kirchner, E. Loew, C. Schröter Lebensgesch. der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Stuttgart (1908). p. 319.

²⁾ P. Klemm, l. c. p. 511.

Man sieht aus der vorangegangenen Aufzählung, daß die Ausbildung von Steinzellen außerordentlich verschieden und an keine Gattung gebunden ist. Es ist daher das Vorhandensein derselben nur zur Unterscheidung der Arten zu verwenden.

B. Spezielle Betrachtung der einzelnen Gattungen und Arten.

1. *Juniperus*.

Die Gattung ist charakterisiert durch verzweigte oder unverzweigte Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Es entspringen immer mehrere, bis vier astartige Fortsätze am Hoftüpfelwall. Am Rande des Phloems treten in Nadel- wie in Schuppenblättern zwei oder mehrere meist verholzte Bastfasern auf. Der Harzgang liegt nahe der Epidermis und unterbricht die hypodermale Bastschicht. Die Spaltöffnungen sind auf der Oberseite, bei einigen schuppenförmigen Blättern ausnahmsweise auf der Assimilationsseite ausgebildet. Größe der Spaltöffnungen zwischen $55\ \mu$ und $35\ \mu$, Dicke der Cuticula zwischen $5\ \mu$ und $10\ \mu$. Eine verdickte Parenchymscheide umgibt meistens den Harzgang, der in den Nadeln als Kiel auf der Unterseite des Blattes vorspringt, in den Schuppenblättern eine Einbuchtung bewirkt. Hypodermale Bastschicht $20\ \mu$ dick. Die Arten *Juniperus phoenicea*, *J. procera*, *J. macropoda* besitzen Steinzellen.

Sektion I. *Sabina* Spach.

Juniperus recurva Hamilt. — Untersucht: Himalaja (*Hooker*). Blätter 2 mm lang. Der Harzgang beginnt 1,2 mm unter der Blattspitze, wird $360\ \mu$ lang und $180\ \mu$ weit. Die $44\ \mu$ großen Spaltöffnungen werden auf der Oberseite von einem $\frac{1}{3}$ der Breite betragenden Streifen ohne hypodermale Bastschicht unterbrochen. Cuticula $9\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 1 oder 2 Bastzellen.

Juniperus Pseudo-Sabina Fisch. et Mey. — Untersucht: Baltistan (*Meebold* Nr. 3268). Blätter 8 mm lang.

Harzgang beginnt 3 mm unter der Spitze und endet blind über der Insertion. Unter der Spitze beträgt seine radiale Weite $128\ \mu$, im angewachsenen Teile $800\ \mu$. Epithelschicht verholzt. Zellen der 3 Reihen starken hypodermalen Bastschicht $15\ \mu$ dick. Harzgang mit verdickter Parenchymscheide. Die Blattoberseite zeigt einen $200\ \mu$ breiten, von Spaltöffnungen freien und mit einer Bast-schicht verstärkten Streifen. Am Rande des Phloems drei $15\ \mu$ dicke Bastzellen.

Folgeblätter 2 mm lang. Harzgang $600\ \mu$ lang. Spaltöffnungen $40\ \mu$ lang, $25\ \mu$ breit. Der einzige Unterschied besteht in den im angewachsenen Grunde des Blattes auffallend langen, zum Gefäßbündel vom Stamm ziehenden Parenchymzellen mit wenig Chlorophyllgehalt.

Juniperus davurica Pall. Untersucht: Usurigebiet (*Maack*):

- a) Jugendblatt. Länge 7 mm. Harzgang beginnt 2,8 mm unter der Spitze und wird 2 mm lang. Weite $222\ \mu$. Eine Scheide von 3 Reihen verdickter Parenchymzellen umgibt ihn. Zellen der hypodermalen Bastschicht schwach verdickt und wenig verholzt. Auf der Blattoberseite eine durch Bastzellen verstärkte Mittelrippe, welche $\frac{1}{3}$ der Blattbreite beträgt.
- b) Folgeblatt. Länge 2 mm. Harzgang beginnt 0,8 mm unter der Spitze und wird 0,7 mm lang. Weite $\frac{1}{2}$ mm. Hypodermale Bastzellen $10\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $35\ \mu$. Am Rande des Phloems 2 Bastzellen. Die beiden Spaltöffnungsfelder bleiben schmal, da das Palisadengewebe auf die Oberseite weit übergreift. Mittelrippe schmal.

Juniperus Sabina L. — Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder* - Karlowitz). — Schuppenblätter 6 mm lang, Harzgang 3 mm lang, beginnt 4 mm unter der Spitze. Hypodermale Bastschicht $15\ \mu$ dick, greift auf die Oberseite über, welche 2 Spaltöffnungsstreifen trägt. Die Mittelrippe trägt subepidermale Bastzellen, an denen chlorophyllfreie Palisadenzellen ansetzen. Cuticula $7\ \mu$ dick. Epidermiszellen $100\ \mu$ lang. Am Rande des

Phloems 3 Bastzellen. Spaltöffnungen 34μ lang, Breite 26μ .

Juniperus Sabina tamariscifolia Ait. — Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder-Karlowitz*). — Harzgang 5 mm lang. Er beginnt in den 7 mm langen Nadeln 2 mm unter der Spitze und endet blind. Hypodermale Bast-schicht 13μ , Cuticula $4,6\mu$ dick. Die 55μ langen und 27μ breiten Spaltöffnungen liegen auf der Oberseite und entgegen (*Schröter*¹⁾), wenn auch selten, auf der Unterseite. Mittelrippe auf der Oberseite fehlt oft oder ist nur schmal entwickelt. Am Rande des Phloems 3 Bastzellen.

Juniperus excelsa Bieb. — Untersucht: Armenien (*Sinten* Nr. 5520). — Schuppenblätter $2\frac{1}{2}$ mm lang. Harzgang $\frac{3}{4}$ mm lang, 224μ weit. Er beginnt $\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze und wird ebenso wie das Gefäßbündel von einer verdickten Parenchymscheide umgeben. Hypodermale Bastzellen 15μ , Cuticula 8μ dick. Epidermiszellen 60μ lang. Ausgezeichnet ist die Art durch die großen Kalkoxalatkrystalle, welche 3μ im Durchmesser erreichen. Am Rande des Phloems drei 15μ dicke Bastzellen. Blattoberseite mit Mittelrippe. Spaltöffnungen 47μ lang, 33μ breit. Palisadenschicht doppelt.

Juniperus macropoda Boiss. Untersucht: Persien (*Bornmüller* Nr. 4345). — Blätter 3 mm lang. Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze, eirund, 1 mm lang, $\frac{1}{2}$ mm weit. Hypodermale Bast-schicht aus einer Zellenreihe, 17μ dick. Am Rande des Blattes greift sie auf die Oberseite über. Dagegen fehlt sie der Mittelrippe auf der Oberseite. Cuticula 10μ dick. Am Rande des Phloems 4 Bastzellen von 10μ Dicke. Spaltöffnungen 51μ lang, 34μ breit. Harzgang, Gefäßbündel und Tracheidensaum mit verdickter Parenchymscheide. Die Spaltöffnungen treten auch auf der Blattunterseite auf und unterbrechen seitlich des Harzganges die hypodermale Bast-schicht. Die wurzelförmigen Verdickungen sind in den

¹⁾ Vergl. *C. Schröter*, l. c. p. 328.

Zellen des Tracheidensaumes sehr zahlreich vorhanden und am Ende kugelig verdickt. Unter der Oberseite der Blattspitze werden $50\ \mu$ große Steinzellen ausgebildet.

Juniperus procera Hochst. — Untersucht: Abyssinien (*Rosen*). — Blätter $2\frac{1}{2}$ mm lang. Harzgang $\frac{1}{2}$ mm lang, $180\ \mu$ breit, von einer Reihe verdickter Parenchymzellen umgeben. Hypodermale Bast-schicht doppelt, ihre Zellen $11\ \mu$ dick. Blattoberseite mit $300\ \mu$ breiter Mittelrippe. Cuticula $11\ \mu$ dick. Zwischen Blattoberseite und Gefäßbündel treten $126\ \mu$ lange und $54\ \mu$ breite Steinzellen auf. Länge der Spaltöffnungen $46\ \mu$, Breite $32\ \mu$.

Juniperus mexicana Schiede. Untersucht: Mexico — (*Pringle* Nr. 6298). — Blätter 5 mm lang. Harzgang 2 mm lang, $270\ \mu$ breit, von 4 Reihen verdickter Parenchymzellen umkleidet. Hypodermale Bast-schicht $15\ \mu$, Cuticula $15\ \mu$ dick. Länge der Spaltöffnungen $52\ \mu$, Breite $35\ \mu$. Am Rande des Phloems 4 Bastzellen, mit einer Dicke von $25\ \mu$. Blattoberseite mit Mittelrippe ohne Bast-schicht. Epidermiszellen $60\ \mu$ lang.

Juniperus phoenicea L. Untersucht: Canaren (*Bornmüller* 3057). — Blätter 2 mm lang. Harzgang $1\frac{1}{4}$ mm lang, $234\ \mu$ weit. Cuticula $11\ \mu$, Zellen der hypodermalen Bast-schicht $15\ \mu$ dick. Gefäßbündel und Harzgang umschließt eine verdickte Parenchymscheide. Spaltöffnungen $50\ \mu$ lang, $32\ \mu$ breit. Steinzellen $100\ \mu$ groß, Epidermiszellen $60\ \mu$ lang. Blattoberseite zeigt eine Mittelrippe.

Juniperus thurifera L. — Untersucht kultiviertes Material (Botanischer Garten Bonn. *Beissner*). — Nadelblätter 10 mm lang. Harzgang beginnt 2 mm unterhalb der Spitze und endet blind im Blatt. Er verläuft unter der hypodermalen Bast-schicht, ohne sie zu unterbrechen. Weite $50\ \mu$. Cuticula $5\ \mu$, die Zellen der hypodermalen Bast-schicht $15\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 3 Bastzellen mit $5\ \mu$ Dicke. Blattoberseite mit Mittelrippe. Spaltöffnungen $39\ \mu$ lang, $20\ \mu$ breit. Die 3 Harzgänge im Stamm kommunizieren nicht mit denen der Blätter.

Juniperus chinensis L. — Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder*, Karlowitz bei Breslau). — Blattlänge 7 mm. Harzgang beginnt in den Folgeblättern 1 mm, in den Nadelblättern 5 mm unter der Spitze und wird 2 mm lang, $240\ \mu$ weit. Cuticula $5\ \mu$, hypodermale Bastschicht $15\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems vier $20\ \mu$ dicke Bastzellen. Länge der Spaltöffnungen $45\ \mu$, Breite $30\ \mu$. Blattoberseite mit $200\ \mu$ breiter Mittelrippe.

Juniperus virginiana L. Untersucht kultiviertes Material Baumschule *Guder*—Karlowitz. — Schuppenblätter 5 mm lang. Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze und endet blind über der Insertion. Nicht oft treten 1 oder 2 seitliche Gänge auf, die dann 2 mm unter der Spitze erst beginnen. Die $15\ \mu$ dicke hypodermale Bastschicht ist doppelt. Cuticula $5\ \mu$ dick. Am Phloemrande fünf $25\ \mu$ dicke Bastzellen. Blattoberseite mit $200\ \mu$ breiter Mittelrippe und hypodermaler Bastschicht. Spaltöffnungen $51\ \mu$ lang, $37\ \mu$ breit. Harzgang mit Parenchym-scheide.

Juniperus virginiana var *Schottii*. Hort. Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder* — Karlowitz). — Gleicht *J. virginiana* L.

Juniperus virginiana var. *tripartita* Hort. Untersucht kultiviertes Material, Baumschule *Guder*, Karlowitz bei Breslau. — Schuppenblätter $10\ \mu$ lang. Harzgang beginnt $4\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze und erreicht 3 mm Länge. Seine Weite $210\ \mu$. Subepidermale Bastschicht einreihig und $20\ \mu$, Cuticula $6\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems drei $25\ \mu$ dicke Bastzellen. Länge der Spaltöffnungen $40\ \mu$, Breite $34\ \mu$. Harzgang mit zwei Reihen konzentrischer, verdickter Parenchymzellen.

Juniperus occidentalis Hook. Untersucht: Botanischer Garten Bonn, *Beissner*.

a) Jugendblatt. Nadeln 8 mm lang. Harzgang beginnt 3 mm über der Insertion, wird $2\frac{1}{4}$ mm lang. Die $15\ \mu$ dicke hypodermale Bastschicht ist doppelt, gegen die Spitze hin oft dreifach. Den Harzgang umgibt eine drei Reihen starke Parenchymscheide. Am

Rande des Phloems 2 Bastzellen. Spaltöffnungen $36\ \mu$ Länge, $25\ \mu$ Breite. Harzgangweite $175\ \mu$.

- b) Schuppenblatt. Länge 2 mm. Harzgang $\frac{1}{2}$ mm lang, beginnt 1 mm unterhalb der Spitze. Dicke der hypodermalen, einfachen Bastschicht $12\ \mu$, die der Cuticula $5\ \mu$. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $24\ \mu$ breit.

Juniperus pachyphlaea Torr. — Untersucht: Arizona (*Macdougal* Nr. 86). — Harzgang $\frac{1}{2}$ mm lang, beginnt 1 mm unter der Spitze. Blattlänge 2 mm. Weite des Harzganges $180\ \mu$. Hypodermale Bastschicht doppelt, $15\ \mu$ dick; Cuticula $10\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 2 Bastzellen. Spaltöffnungen $45\ \mu$ lang, $30\ \mu$ breit. Sie treten, besonders im angewachsenen Teile des Blattes, auch auf der Unterseite auf und unterbrechen die Bastschicht. Mittelrippe auf der Blattoberseite vorhanden.

Juniperus communis $\times$ *sabina*. Untersucht: Siebenbürgen (*Flora exsiccata austro-hungarica* Nr. 1481). Blattlänge 6 mm. Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze und endet 1 mm über der Insertion blind. Hypodermale Bastschicht $12\ \mu$ dick und einfach, Cuticula $11\ \mu$. Die Mittelrippe auf der Oberseite des Blattes beginnt erst kurz über der Stelle, wo das Blatt angewachsen ist. Sie entbehrt einer Bastschicht. Spaltöffnungen $40\ \mu$ lang, $28\ \mu$ breit. Den Harzgang umkleiden drei Reihen verdickter Parenchymzellen.

Das Auftreten eines Bastbelages am Phloem von nur 3 Zellen Stärke hat das Blatt mit dem von *Juniperus sabina* gemein, während die Größe der Spaltöffnungen, die Dicke der Cuticula und die starke Harzgangscheide auf *Juniperus communis* deuten. Dagegen kommuniziert der Harzgang im Blatte des Bastardes nicht mit dem des Stammes, wie wir es bei *Juniperus communis* finden.

Section II. *Oxycedrus* Spach.

Juniperus rigida Sieb. et Zucc. — Untersucht: Botanischer Garten, Bonn (*Beissner*) — Nadeln 9 mm lang. Harzgang läuft von der Spitze bis zur Insertionsstelle.

Eine Schicht $16\ \mu$ dicker Bastzellen unter der Epidermis. Cuticula $4\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 10 Bastzellen, die $25\ \mu$ dick werden. Das Spaltöffnungsband auf der Blattoberseite ist halbmondförmig eingesenkt. Spaltöffnungen $54\ \mu$ lang, $21\ \mu$ breit. An der Blattoberseite tritt die hypodermale Bastschicht am Rande weit über.

Juniperus communis var. *hibernica* Gord. — Untersucht kultiviertes Material. Baumschule *Guder* — Karlowitz bei Breslau. — Bei dieser einzigen Art kommunizieren die Harzgänge in den Blättern mit denen des Stammes. Im Blatt beginnt der Harzgang $2\frac{1}{2}$ mm unter der Spitze und läuft bis über die Insertion des nächstunteren Sprosses am Stamme herab. 2 Reihen Parenchymzellen umkleiden ihn. Die hypodermale Bastschicht ist gegenüber dem Harzgang meist doppelt, sonst einfach. Ihre Dicke $11\ \mu$. Cuticula $10\ \mu$ dick. Am Phloemrande fünf $15\ \mu$ dicke Bastzellen. Spaltöffnungen $55\ \mu$ lang, $30\ \mu$ breit. Auf der Blattoberseite eine schmale Mittelrippe ohne Bastschicht.

Juniperus nana Willd. Untersucht kultiviertes Material. Botanischer Garten, Bonn (*Beisner*.) Nadeln 10 mm lang. Harzgang beginnt unter der Spitze und wird 8 mm lang, $100\ \mu$ weit. Die hypodermale Bastschicht ist einreihig, $10\ \mu$ dick. Die Cuticula der über $120\ \mu$ langen Epidermiszellen wird $10\ \mu$ stark. Am Rande des Phloems 3 oder 4 Bastzellen, die $25\ \mu$ dick werden. Spaltöffnungen $38\ \mu$ lang, $23\ \mu$ breit. Mittelrippe auf der Blattoberseite nicht entwickelt. Palisadenparenchym zweischichtig.

Juniperus oxycedrus L. — Untersucht: Kroatien (*Flora exsiccata austro-hungarica*. Nr. 1837). — Nadel 14 mm lang. Der Harzgang tritt in einer Länge von 7 mm auf und beginnt 5 mm unterhalb der Spitze. Seine Weite $50\ \mu$. Die einfache hypodermale Bastschicht $20\ \mu$ dick, Cuticula $10\ \mu$ stark. Am Rande des Phloems eine doppelte Reihe $30\ \mu$ dicker Bastzellen. Länge der Spaltöffnungen $35\ \mu$, Breite $27\ \mu$. Die mit hypodermalem Bast verstärkte Mittelrippe auf der Blattoberseite $180\ \mu$ breit. Epidermiszellen $100\ \mu$ lang.

Juniperus macrocarpa Sibth. — Untersucht: Sizilien (Ross. Nr. 487). — Harzgang 9 mm lang, 48 μ weit und beginnt direkt unterhalb der Spitze. Hypodermale Bastschicht 15 μ dick, ebenso die Cuticula. Länge der Epidermiszellen 100 μ . Am Rande des Phloems 3 Reihen stark entwickelter Bastzellen. Am Rande des Xylems ist ein dreischichtiges Collenchym entwickelt. Spaltöffnungen 45 μ lang, 35 μ breit. Mittelrippe 100 μ breit auf der Blattoberseite mit hypodermalen Bast und unter diesem im Querschnitt Palisadenzellen.

Juniperus Cedrus Webb. — Untersucht: Canaren (Bornmüller 3054). — Nadeln 16 mm lang. Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze und läuft als Kiel an der Unterseite herab. Am Zweige tritt er ebenfalls als Kiel auf. Seine Weite 72 μ . Hypodermale Bastschicht 18 μ , Cuticula 12 μ dick. Am Rande des Phloems 4 oder fünf 15 μ dicke Bastzellen. Spaltöffnungen 44 μ lang, 26 μ breit. Blattoberseite mit 180 μ breiten mit Bast besetztem Mittelstreifen. Harzgang mit Parenchymscheide.

Section III. *Caryocedrus* Endl.

Juniperus drupacea Labill. — Untersucht: Cilicien (Siehe Nr. 320). — Blatt 10 mm lang. Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze und setzt sich bei nur 10 μ Weite im Zweige fort. Hypodermale Bastschicht 20 μ , Cuticula 5 μ dick. Am Rande des Phloems 20 bis 25 μ dicke Bastzellen. Spaltöffnungen 45 μ lang, 30 μ breit. Charakteristisch für die Art ist das Auftreten seitlicher Verzweigungen an den wurzelförmigen Fortsätzen der Zellen des Tracheidensaumes.

2. *Actinostrobus* Miq.

Die Gattung ist charakterisiert durch Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Am Wall des Hoftüpfels entspringen zwei oder drei solcher wurmförmiger Fortsätze. Am Rande des Phloems treten bastartige Zellen auf, welche unverholzt sind. Der Harzgang legt sich an das Gefäßbündel an, ohne die hypodermale Bastschicht zu

unterbrechen. Die Spaltöffnungen sind auf Ober- und Unterseite des Blattes verteilt. Obwohl dadurch auf ersterer Lücken im Bastring entstehen, tritt kein mechanischer Schutz ein. Vielleicht gewährt ihn die $20\ \mu$ dicke Cuticula. Harzgang zeigt immer eine Parenchymscheide. Das Palisadenparenchym ist doppelschichtig. Das Zuleitungsgewebe wird durch den stark entwickelten Tracheidensaum zurückgedrängt. Die Größe der Spaltöffnungen schwankt wenig. Steinzellen fehlen.

Actinostrobus acuminatus Parl. Untersucht: Westaustralien (*Pritzel* Nr. 119). — Blattlänge 8 mm. Harzgang beginnt 2 mm unter der Spitze und wird 6 mm lang. Hypodermale Bast-schicht $25\ \mu$, Cuticula $20\ \mu$ dick. Am Phloemrande 3 verdickte Sklerenchymfasern, welche Cellulosereaktion zeigen. Spaltöffnungen $45\ \mu$ lang, $35\ \mu$ breit mit tiefem Vorhof. Die Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes sind kurz und dick und gleichen einem abgestumpften Kegel. Epidermiszellen $120\ \mu$ lang.

Actinostrobus pyramidalis Miq. Untersucht: Westaustralien (*Pritzel* Nr. 391). — Blattlänge 4 mm. Harzgang 2 mm lang, beginnt 1 mm unterhalb der Spitze. Zellen der hypodermalen Bast-schicht, ebenso die Cuticula 15 bis $20\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 3 Sklerenchymfasern, welche $25\ \mu$ Dicke erreichen. Spaltöffnungen $42\ \mu$ lang, $28\ \mu$ breit. Epidermiszellen $75\ \mu$ lang.

3. *Callitris* Vent.

Die Gattung kennzeichnet das Auftreten von Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Bei den Arten *Callitris quadrivalvis* und *C. robusta* verwachsen die Fortsätze zu Querbalken. Am Rücken des Gefäßbündels liegen immer Bastzellen. Der Harzgang lehnt sich an das Gefäßbündel an. Die Spaltöffnungen liegen auf Blattober- und unterseite. Sie werden $40\ \mu$ lang, $30\ \mu$ breit. Die Dicke der Cuticula beträgt $20\ \mu$. Außer der kontinuierlichen Bast-schicht treten Stereiden in den Blättern von *Callitris iuniperoides* und *C. rhomboidea* auf. Das Palisadenparenchym ist sehr stark, oft in drei Schichten

ausgebildet und reicht bis an das Gefäßbündel heran. Außer einem medianen Harzgang treten bei den Arten *Callitris quadrivalvis* und *C. Balansae* sekundäre auf. In den angewachsenen, unteren Teil des Blattes ragt die collenchymatische Parenchymscheide des Stammgefäßbündels hinein. Haarartige Auswüchse der Epidermiszellen werden bei *Callitris quadrivalvis* und *C. robusta* ausgebildet.

Sektion I. *Octoclinis* (F. v. Müll.) Benth.

Von dem einzigen Vertreter *Callitris Macleyana* F. v. Müll., stand mir Material nicht zur Verfügung.

Sektion II. *Hexaclinis* Benth.

Callitris rhomboidea R. Br. — Untersucht: Sydney (*Betche*). — Schuppenblätter 4 mm lang. Harzgang 1 mm lang, 130 μ weit. Er beginnt 1½ mm unterhalb der Spitze des Blattes. Hypodermale Bastschicht 20 μ , Cuticula 15 μ dick, Epidermiszellen 60 μ lang. Am Rande des Phloems 3 Bastzellen, welche sich aus der Gefäßbündel und Harzgang umgebenden verdickten Parenchymscheide abheben. Spaltöffnungen 40 μ lang, 27 μ breit. Steinzellen 210 μ lang. An den Stellen, wo Blätter sich decken, fehlen bei dieser Art die früher erwähnten Cuticularverdickungen.

Callitris robusta R. Br. — Untersucht: Westaustralien (*Pritzel* Nr. 848). — Blatt 3 mm lang. Der 1½ mm lange Harzgang beginnt ½ mm unter der Spitze und wird 128 μ weit. Oft folgt ihm median ein zweiter Sekretbehälter. Hypodermale Bastschicht und Cuticula 20 μ dick. Spaltöffnungen 35 μ lang, 27 μ breit. Am Phloemrande 8 Bastzellen. Harzgang, Gefäßbündel und Tracheidensaum mit stark verdickter Parenchymscheide.

Callitris Balansae Schltr. — Untersucht: Neukaledonien (*Schlechter* Nr. 15 179). — Blätter 4 mm lang. Der 1½ mm lange Harzgang beginnt unter der Spitze und ist 300 μ weit. Hypodermale Bastschicht 15 μ , Cuticula 20 μ dick. Spaltöffnungen 35 μ lang, 25 μ breit. Am Rande des Phloems 4 Bastzellen. Selten verwachsen die

wurzelförmigen Fortsätze in den Zellen des Tracheidensaumes zu Querbalken. Außer dem medianen Hauptharzgange treten oft seitliche, tiefer liegende auf.

Sektion III. *Pachylepis* (Brongn.) Benth.

Callitris iuniperoides Th. Dur. et Schinz. Untersucht: Kapland (*Drège*). — Schuppenblätter 2 mm lang. Der $1\frac{1}{4}$ mm lange und $320\ \mu$ weite Harzgang beginnt $\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze. Hypodermale Bastschicht $15\ \mu$ dick, ebenso die Cuticula. Am Rande des Phloems zwei oder drei $25\ \mu$ dicke Bastzellen. Spaltöffnungen $45\ \mu$ lang, $34\ \mu$ breit. Sklereiden werden im Grunde des Blattes ausgebildet in einer Länge von $480\ \mu$, also fast $\frac{1}{4}$ der Blattlänge. Palisadenparenchym mehrschichtig. Epidermiszellen $60\ \mu$ lang.

Callitris natalensis Endl. — Untersucht kultiviertes Material. Botanischer Garten, Dresden. — Nadelblätter 5 mm lang. Der $1\frac{1}{2}$ mm lange, $30\ \mu$ weite Harzgang beginnt 2 mm unterhalb der Spitze. Hypodermale Bastschicht $10\ \mu$, Cuticula $9\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems 3 Bastzellen. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $27\ \mu$ breit. Harzgang mit Parenchymscheide.

Sektion IV. *Eucallitris* Eichl.

Callitris quadrivalvis Vent. — Untersucht kultiviertes Material, Montpellier. (Vitou.) Blätter 6 mm lang. Harzgang 1 mm lang, beginnt 1 mm unter der Spitze. Oft folgt ihm 1 mm tiefer ein zweiter. Hypodermale Bastschicht $8\ \mu$, Cuticula $12\ \mu$ dick. Am Rande des Phloems mehrere Bastzellen bis $30\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $24\ \mu$ breit. Epidermiszellen $20\ \mu$ lang.

4. *Fitzroya* Hook f.

Die Gattung wird charakterisiert durch das Fehlen der wurmartigen Fortsätze in den Zellen des Tracheidensaumes. Ebenso entbehrt der Phloemrand des Bastzellenbelages. Der Harzgang lehnt sich an das Gefäßbündel an. Stereiden

werden ausgebildet. Die Spaltöffnungen treten auf Ober- und Unterseite auf. Cuticula und hypodermale Bastschicht werden $25\ \mu$ stark. Eine Parenchymscheide umgibt den Harzgang.

Fitzroya patagonica Hook. — Untersucht: Cordilleren der Provinz Valdivia in Chile (*Lechler* Nr. 1448). Blattlänge 3 mm. Der 1 mm lange Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze. Hypodermale Bastschicht 25, Cuticula $20\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $31\ \mu$ lang, $25\ \mu$ breit. Ober- und Unterseite des Blattes mit Mittelrippe und hypodermaler Bastschicht. Epidermiszellen $36\ \mu$ lang. Osteosklereiden $100\ \mu$ lang, $5\ \mu$ dick. Stereiden treten auf.

5. *Thuyopsis* Sieb. et Zucc.

Die Gattung wird charakterisiert durch das Fehlen der wurzelförmigen Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Es sind nur Hoftüpfel vorhanden. Ebenso entbehrt der Phloemrand der Bastzellen. Der Harzgang liegt unter der hypodermalen Bastschicht, die er aber nicht unterbricht. Stereiden fehlen. Die Zweige sind dorsiventral. Harzgang und Gefäßbündel mit Parenchymscheide.

Thuyopsis dolabrata Sieb. et. Zucc. — Untersucht kultiviertes Material. (Botanischer Garten Breslau.) — Kantenblätter 4 mm lang. Der Harzgang beginnt $\frac{1}{2}$ mm unter der Spitze und ist $2\frac{1}{2}$ mm lang. Flächenblätter 5 mm lang. Der Harzgang beginnt 2 mm unter der Spitze und endet 1 mm über der Insertion. Nicht selten treten seitliche hinzu. Hypodermale Bastschicht $15\ \mu$, Cuticula $5\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $37\ \mu$ lang, $26\ \mu$ breit. Epidermiszellen weniger als $75\ \mu$ lang. Palisadenparenchym ist auf der morphologischen Oberseite der Zweige stark, meist in zwei Reihen entwickelt.

6. *Libocedrus* Endl.

Die Gattung ist charakterisiert durch das Fehlen wurzelförmiger Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Ausgenommen ist *Libocedrus decurrens*. Diese Art weist schon die Ansätze von zapfenartigen Vorsprüngen auf.

Am Rande des Phloems treten wenige Bastzellen auf. Der Harzgang lehnt sich an das Gefäßbündel an. Seitliche Harzbehälter werden nicht ausgebildet. Die Größe der Spaltöffnungen schwankt in den Grenzen von 35 und 37 μ . Sie treten auf der Ober- und Unterseite des Blattes auf. Die hypodermale Bastschicht ist 15 μ dick, selten doppelt. Die Blätter von *Libocedrus tetragona* und *L. chilensis* bilden Stereiden aus. Die Cuticula wird 10 μ dick.

Libocedrus chilensis Endl. — Untersucht: Argentinien (*Buchtien*). — Die 3 mm langen Kantenblätter tragen einen 1 $\frac{3}{4}$ mm langen Harzgang, der $\frac{1}{4}$ mm unterhalb der Spitze beginnt. Die Flächenblätter sind 1 mm, ihr Harzgang $\frac{1}{2}$ mm lang. In Übereinstimmung mit *Klemm*¹⁾ beobachtete ich am Phloemrande immer mindestens eine Bastzelle, oft auch zwei. Spaltöffnungen 37 μ lang, 25 μ breit. Sklereiden 230 μ lang, liegen mit ihrer Längsachse parallel zum Gefäßstrang. Der Tracheidensaum ist nur einige Zellen stark entwickelt auf dem Querschnitt. Palisadenparenchym zweischichtig.

Libocedrus tetragona Endl. — Untersucht: Neu-Seeland (*Preiß*). — Blattlänge 3 $\frac{1}{2}$ mm. Harzgang 640 μ lang, 80 μ weit. Hypodermale Bastschicht 10 μ , Cuticula 15 μ dick. Am Rande des Phloems zwei 15 μ dicke Bastzellen. Spaltöffnungen 35 μ lang, 25 μ breit. Im oberen, freien Teile des Blattes werden wenig stark verdickte Stereiden von 200 μ Größe ausgebildet. Sie liegen mit ihrer Längsachse von der Blattfläche zum Gefäßbündel gerichtet. Der Tracheidensaum ist wenige Zellenlagen stark entwickelt.

Libocedrus decurrens Torr. — Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder* — Karlowitz bei Breslau). Die 2 mm langen Kantenblätter tragen einen Harzgang, der $\frac{1}{2}$ mm unter der Spitze beginnt und $\frac{1}{4}$ mm über der Insertion endet. Im Flächenblatt beginnt er 800 μ unterhalb der Spitze und wird nur $\frac{1}{2}$ mm lang. Hypodermale Bastschicht 10 μ dick. Epidermiszellen 90 μ lang mit 11 μ

¹⁾ *P. Klemm*, l. c. p. 509.

starker Cuticula. Spaltöffnungen $37\ \mu$ lang, $32\ \mu$ breit. Am Rande des Phloems 1 oder 2 Bastzellen. Unter dem medianen Harzgang wird in den Kantenblättern oft noch ein zweiter ausgebildet.

7. *Thuya* L.

Der Gattung fehlen die Verdickungen in den Tracheiden des Tracheidensaumes. Am Rande des Phloems treten keine Bastzellen auf. Der Harzgang liegt unter der Epidermis. Seitliche und auch median sekundäre Sekretbehälter werden ausgebildet. Erstere treten bei allen Arten außer *Thuya plicata*, letztere bei *Thuya Standishi* und *Th. occidentalis* auf. Alle Arten sind dorsiventral gebaut in ihren Zweigen. Die Cuticula ist in der Sektion *Euthuya* $5\ \mu$, bei den Vertretern von *Macrothuya* $10\ \mu$ stark entwickelt. Schleimzellen wurden im Zuleitungsgewebe nachgewiesen. Die Größe der Spaltöffnungen ist durchgehend $35\ \mu$, ebenso beträgt die Länge des Harzganges $\frac{1}{2}$ mm. Stereiden wurden im Blatt von *Thuya Standishi* nachgewiesen. Der hypodermale Bast ist eine Zellschicht stark.

Sektion I. *Euthuya* Don.

Thuya plicata Don. — Untersucht kultiviertes Material (Baumschule *Guder* Karlowitz bei Breslau). — Der $\frac{1}{2}$ mm lange und $\frac{1}{4}$ mm weite Harzgang beginnt $\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze des 3 mm langen Blattes. Im Kantenblatte setzt er 1 mm unter der Spitze an, kann aber auch fehlen. Hypodermale Bastschicht $11\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $33\ \mu$ lang, $30\ \mu$ breit. Epidermiszellen $70\ \mu$ lang, Cuticula $6\ \mu$ dick. Der Tracheidensaum zeigt wenige Zellschichten. Eine 2 Reihen starke, verdickte Parenchym-scheide umgibt das Gefäßbündel.

Thuya occidentalis L. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Bonn (*Beißner*). — Der mediane Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze, wird $640\ \mu$ lang und ist $240\ \mu$ weit in den Kantenblättern. Die Flächenblätter bilden ihn $1\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze

aus. Hypodermale Bastschicht $20\ \mu$, Cuticula $6\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $21\ \mu$ breit. Eine verdickte Parenchym Scheide umgibt den Harzgang. Außer dem mittleren Harzgang treten sehr oft 2 seitliche oder median sekundäre auf.

Thuja occidentalis var. *aurea* Hort. — Untersucht: Baumschule *Guder*—Breslau. — Harzgang $100\ \mu$ weit. Cuticula $8\ \mu$, hypodermale Bastschicht $20\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $30\ \mu$ lang, $24\ \mu$ breit. Seitliche Harzgänge sehr selten. Epidermiszellen $140\ \mu$ lang.

Thuja occidentalis var. *Howeyi* Hort. — Das Material ist ebenso wie das der folgenden Varietäten kultiviert in der Baumschule *Guder*—Karlowitz bei Breslau. — Harzgang $75\ \mu$ weit, $\frac{1}{2}$ mm lang. Cuticula $10\ \mu$, hypodermale Bastzellen $14\ \mu$ dick. Palisadenschicht 2 Reihen stark. Spaltöffnungen $30\ \mu$ lang, $25\ \mu$ breit.

Thuja occidentalis var. *Bodmeri* Hort. Die Blätter sind sehr breit gedrückt. Hypodermale Bastschicht $13\ \mu$ dick, nicht geschlossen. Cuticular dicke $7\ \mu$. Spaltöffnungen $37\ \mu$ lang, $24\ \mu$ breit. Seitliche Harzgänge fehlen.

Thuja occidentalis var. *Wareana* Hort. Die sehr dünnen Blätter tragen einen $175\ \mu$ weiten, von der Epidermis bis zum Gefäßbündel sich ausdehnenden Harzgang. Hypodermale Bastzellen $7\ \mu$, die Cuticula $13\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $30\ \mu$ lang, $25\ \mu$ breit. Seitliche Harzgänge treten nicht auf.

Thuja occidentalis var. *recurva nana* Hort. Die Blätter gleichen denen von *Thuja occidentalis* var. *aurea* anatomisch. Cuticula $10\ \mu$ stark.

Sektion II. *Macrothuya* Benth.

Thuja gigantea Nutt. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Breslau. — Blattgröße 5 mm. Der Hauptharzgang beginnt $\frac{1}{4}$ mm unter der Spitze, wird $480\ \mu$ lang und $160\ \mu$ weit. $\frac{3}{4}$ mm unterhalb desselben beginnt meist ein zweiter, medianer Gang. Hypodermale Bastschicht einfach, $15\ \mu$ dick, Cuticula $15\ \mu$ stark. Spaltöffnungen $31\ \mu$ lang, $22\ \mu$ breit. Gefäßbündel mit Paren-

chymische, ebenso der Harzgang. Die Palisadenschicht besteht meist aus 2 Reihen.

Thuya Standishi Carr. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Bonn (*Beißner*). — Der mediane Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze und wird 3 mm lang. Median unter ihm und seitlich auf dem Querschnitt treten weitere Gänge hinzu. Oft fehlt der mediane Harzbehälter und nur 2 seitliche sind ausgebildet. Cuticula 11 μ stark. Die ebenso dicke, hypodermale Bast-schicht ist unvollkommen entwickelt. Spaltöffnungen 35 μ lang, 26 μ breit. Schwach verdickte Stereiden von kugelige Form treten auf und werden 300 μ groß.

8. *Biota* Endl.

Die Gattung ist charakterisiert durch das Auftreten wurmförmiger Verdickungen in den Zellen des Tracheiden-saumes. Am Rande des Phloems wird ein Bastzellenbelag ausgebildet. Immer wird ein Harzgang in den Blättern entwickelt. Sonst stimmt die Gattung mit *Thuya* überein. Schleimzellen fehlen.

Biota orientalis (L.) Endl. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Bonn (*Beißner*). — Blatt-länge 6 mm. Der Harzgang beginnt 3 mm unter der Spitze und wird 1 mm lang. Er bildet eine Einbuchtung auf der Blattunterseite. Hypodermale Bastschicht 8 μ , Cuticula 6 μ stark. Spaltöffnungen 35 μ lang, 25 μ breit. Harzgang und Gefäßbündel zeigen keine Parenchymischeide.

9. *Cupressus* L.

Die Gattung ist charakterisiert durch das Auftreten kleiner Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Am Rande des Phloems werden keine Bastzellen entwickelt. Der Harzgang liegt in den Blättern nahe der Epidermis und ist kurz und ziemlich breit. Die Cuticula ist 10 μ durchschnittlich verdickt. Die Größe der Spaltöffnungen schwankt zwischen 50 μ und 35 μ . Stereiden werden bei den Arten *Cupressus Benthami* und *C. Goveniana*

ausgebildet. Zwischen den Zellen des Zuleitungsgewebes erscheinen chlorophyllfreie Zellen, die keinen Schleim entwickeln. Die hypodermale Bastschicht besteht nur aus einer geschlossenen Zellenreihe, deren Dicke über $15\ \mu$ beträgt. Seitliche Harzgänge werden bei *Cupressus sempervirens*, aber sehr selten auch hier nur ausgebildet. Die Länge des Harzganges schwankt in den Grenzen von $320\ \mu$ und 2 mm.

Cupressus Goveniana Gord. — Untersucht: Californien (*H. E. Brown* Nr. 804). — Länge der Schuppenblätter $1\frac{1}{2}$ mm. Harzgang fehlt meist. Hypodermale Bastschicht $10\ \mu$, Cuticula $15\ \mu$ stark. Erstere ist immer doppelt. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $27\ \mu$ breit. Stereiden treten im Zuleitungsgewebe in einer Größe von $150\ \mu$ auf mit $10\ \mu$ starker Verdickung. Sie sind kugelförmig. Epidermiszellen $80\ \mu$ lang.

Cupressus Benthami Endl. — Untersucht: Mexiko (*Pringle* Nr. 4253). — Blattlänge 3 mm. Der $\frac{1}{2}$ mm lange, $300\ \mu$ weite Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze und bildet einen Buckel. Cuticula $15\ \mu$ stark, ebenso hypodermale Bastschicht. Spaltöffnungen $50\ \mu$ lang, $27\ \mu$ breit. $50\ \mu$ große, schwach verdickte Stereiden treten auf. Das Palisadenparenchym ist meist in zwei Schichten entwickelt.

Cupressus thurifera Humb. Bonpl. et Knuth. — Untersucht: Kult. Material, Montpellier (*Baenitz*). — Blattlänge 2 mm. Harzgang $320\ \mu$ lang; $160\ \mu$ weit. Hypodermale Bastschicht $17\ \mu$, Cuticula $11\ \mu$ dick, Spaltöffnungen $40\ \mu$ lang, $31\ \mu$ breit. Tracheidensaum stark entwickelt, dagegen die Verdickungen in den Zellen nur selten zahlreich. Epidermiszellen $70\ \mu$ lang.

Cupressus torulosa Don. (Plantae exsiccatae Maderenses. *Bornmüller* Nr. 1392.) — Blattgröße 2 mm. Der Harzgang beginnt $\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze, wird $\frac{1}{2}$ mm lang, $150\ \mu$ weit. Er liegt nahe dem Gefäßbündel. Hypodermale Bastschicht $13\ \mu$ stark. Spaltöffnungen $50\ \mu$ lang, $30\ \mu$ breit. Epidermiszellen $50\ \mu$ lang. Cuticula $12\ \mu$ stark. Tracheidensaum stark entwickelt, dagegen die Verdickungen in den Tracheiden selten.

Cupressus glauca Lam. — Untersucht: Spanien. (*M. Winkler*). — Blattlänge 3 mm. Der Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze und wird $\frac{1}{2}$ mm lang. Hypodermale Bastschicht $16\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $51\ \mu$ lang. $27\ \mu$ breit. Epidermiszellen über $100\ \mu$ lang. Der Tracheidensaum durchsetzt den ganzen mittleren Raum des Zuleitungsgewebes.

Cupressus macrocarpa Hartw. — Untersucht: Botanischer Garten, Bonn (*Beißner*). — Blattgröße 2 mm. Harzgang $320\ \mu$ lang, $160\ \mu$ breit, beginnt 1 mm unter der Spitze. Epidermiszellen $100\ \mu$ lang. Cuticula $6\ \mu$ stark. Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $24\ \mu$ breit.

Cupressus Macnabiana Murr. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Bonn (*Beißner*). — Blattlänge 3 mm. Der Harzgang beginnt in den Kantenblättern da, wo das Blatt mit dem Zweige verwächst und wird $\frac{1}{4}$ mm lang, $80\ \mu$ weit. In den Flächenblättern fehlt er. Hypodermale Bastschicht $16\ \mu$, Cuticula $20\ \mu$ dick. Palisadenparenchym zwei- oder dreischichtig. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $25\ \mu$ breit.

Cupressus sempervirens L. var. *pyramidalis* Hort. — Untersucht kultiviertes Material. Baumschule *Guder*, Karlowitz bei Breslau. — Blattlänge 3 mm. Harzgang beginnt 1 mm unter der Spitze, wird $160\ \mu$ weit und endet über der Insertion. Hypodermale Bastschicht $25\ \mu$, Cuticula $8\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $26\ \mu$ breit. Harzgang mit verdickter Parenchymscheide. Außer dem Hauptharzgang treten seltener noch zwei seitliche auf. Palisadenparenchym in 2 Schichten ausgebildet.

Cupressus funebris Endl.

- a) Jugendblätter. — Untersucht kultiviertes Material, Botanischer Garten, Breslau. — Blattlänge 9 mm. Harzgang beginnt 2 mm unter der Spitze und endet über der Insertion blind. Im unteren Teile erweitert er sich. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $20\ \mu$ breit. Hypodermale Bastschicht $20\ \mu$, Cuticula $7\ \mu$ dick. Transfusionsgewebe mit recht stark entwickelten Fortsätzen.

- b) Ältere Blätter. — Untersucht: Schweiz (*Baenitz*). — Blätter 4 mm lang. Harzgang beginnt $\frac{1}{2}$ mm unterhalb der Spitze, endet über der Insertion blind. Palisadenparenchym zeigt den Anfang zu einer zweiten Schicht.

10. *Chamaecyparis* Spach.

Die Gattung ist charakterisiert durch das Fehlen wurmartiger Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes. Am Rande des Phloems werden Bastzellen nicht entwickelt. Der Harzgang nähert sich mehr dem Gefäßbündel. Die Cuticula ist schwach, $5\ \mu$ stark entwickelt. Die hypodermale Bastschicht enthält nur 1 Reihe 8 bis $15\ \mu$ dicker Zellen. Die Spaltöffnungen schwanken in der Größe zwischen 30 und $45\ \mu$. Die Zweige sind plattgedrückt, bei *Chamaecyparis pisifera* und *Ch. nutkaensis* dorsiventral. Schleimzellen treten nicht auf. Seitliche Harzgänge werden in den Blättern der Arten *Chamaecyparis Lawsonia*, *Ch. obtusa*, *Ch. nutkaensis* ausgebildet. Stereiden fehlen. Harzgang mit Parenchymscheide.

Chamaecyparis sphaeroidea Spach. — Untersucht kultiviertes Material, Baumschule *Guder* — Karlowitz bei Breslau. — Harzgang fehlt meist. Seine Länge $300\ \mu$, Breite $160\ \mu$. Cuticula $5\ \mu$, hypodermale Bastschicht $15\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $31\ \mu$ lang, $23\ \mu$ breit. Aus dem Stamm ragt in den unteren, angewachsenen Teil des Blattes die Collenchymscheide des Zweiggefäßbündels hinein. Zwischen den Zellen des Zuleitungsgewebes werden auch chlorophyllfreie Zellen ausgebildet.

Chamaecyparis Lawsonia Parl. — Untersucht kultiviertes Material. Baumschule *Guder* — Karlowitz bei Breslau. — Blätter 2 mm lang. Der Harzgang beginnt in Flächen- und Kantenblättern 1 mm unter der Spitze und wird $\frac{1}{2}$ mm lang. Hypodermale Bastschicht $10\ \mu$, Cuticula $5\ \mu$ stark. Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $27\ \mu$ breit. Palisadenparenchym zweischichtig. Chlorophyllfreie Zellen erscheinen im Zuleitungsgewebe. Tracheidensaum stark entwickelt. Seitliche Harzgänge treten auf.

Chamaecyparis Lawsonia f. erecta viridis. Hort. — Das Material, sowie das der folgenden Varietäten ist in der Baumschule *Guder* kultiviert (Karlowitz bei Breslau). — Nur ein Harzgang tritt auf. Hypodermale Bastschicht $13\ \mu$, Cuticula $4\ \mu$ stark. Spaltöffnungen $35\ \mu$ lang, $29\ \mu$ breit. Der Harzgang beginnt $80\ \mu$ unter der Spitze und wird $120\ \mu$ weit.

Chamaecyparis Lawsonia f. pyramidalis alba. Hort. Der hypodermale Bast wird $10\ \mu$, die Cuticula $5\ \mu$ stark. Der Harzgang erreicht $640\ \mu$ Länge, $130\ \mu$ Weite.

Chamaecyparis Lawsonia f. aurea. Hort. Die hypodermale Bastschicht wird $5\ \mu$ dick, die Cuticula $11\ \mu$. Palisadenparenchym zweischichtig.

Chamaecyparis Lawsonia f. robusta nana. Hort. Ein sehr kurzer, nur $130\ \mu$ langer Harzgang tritt auf. Hypodermale Bastschicht $15\ \mu$, Cuticula $6\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $37\ \mu$ lang, $26\ \mu$ breit.

Chamaecyparis Lawsonia f. gigantea. Hort. Mehrere Harzgänge, sowohl seitlich als median über einander, werden ausgebildet. Die Länge des Hauptganges median $240\ \mu$, Weite $160\ \mu$. Hypodermale Bastzellen $12\ \mu$ dick.

Chamaecyparis nutkaensis Spach. — Untersucht kultiviertes Material. Scheitniger Park, Breslau. (Obergärtner *Heinze*). — Blattlänge 7 mm. Der Harzgang beginnt $2\frac{1}{2}$ mm unter der Spitze und wird 2 mm lang. In den Flächenblättern setzt er $\frac{1}{2}$ mm tiefer an. Seitliche Gänge treten nur in den Flächenblättern auf. Hypodermale Bastschicht $20\ \mu$, Cuticula $7\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $46\ \mu$ lang, $26\ \mu$ breit. Harzgang mit verdickter Parenchymscheide.

Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc. var. *gracilis*. Hort. Untersucht kultiviertes Material. Scheitniger Park, Breslau. Blattlänge 3 mm. Der Harzgang beginnt im Flächenblatt 2 mm unter der Spitze, im Kantenblatt 1 mm darunter und endet $\frac{1}{2}$ mm über der Insertion. Hypodermale Bastschicht 10 bis $15\ \mu$, Cuticula $6\ \mu$ dick. Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $21\ \mu$ breit. Eine Parenchymscheide umgibt Harzgang und Gefäßstrang.

Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc. — Das Material ebenso wie das der untersuchten, folgenden Varietät aus der Baumschule *Guder* (Karlowitz bei Breslau). — Blattlänge 5 mm. Der Harzgang beginnt in den Flächenblättern 1 mm, in den Kantenblättern $\frac{1}{2}$ mm unter der Spitze und wird 1 mm lang. Seitliche Sekretbehälter, die oft auftreten, beginnen 1 mm über der Insertion mit $\frac{1}{2}$ mm Länge, $\frac{1}{4}$ mm Weite. Oft fehlt der mediane Hauptgang und nur seitliche sind ausgebildet. Hypodermale Bastschicht 11 μ , Cuticula 6 μ dick. Spaltöffnungen 31 μ lang, 20 μ breit. Chlorophyllfreie Zellen treten im Zuleitungsgewebe auf.

Chamaecyparis obtusa var. *lycopodioides* Carr. Cuticula 8 μ , Bastzellen unter der Epidermis 7 μ stark. Blätter meist ohne Harzgang. Spaltöffnungen 27 μ breit.

C. Alters- und Jugendblätter.

I. Spezielle Untersuchung von *Retinispora*.

Die jetzt eingezogene Gattung *Retinispora* umfaßt die Jugend- und Übergangsformen von *Thuya* und *Chamaecyparis*.¹⁾ Die Stammform trägt Schuppenblätter. Die Jugendform besitzt nur nadelförmige Blätter. Dazwischen schaltet sich eine Übergangsform ein, welche beiderlei Blattgestalten ausgliedert. Die Schuppenblätter der Übergangsformen gleichen den Blattgebilden der Stammform, ebenso wie die Nadelblätter der Übergangsform denen der Jugendform vollständig entsprechen. Daher kann sich die folgende Darstellung auf die Nadelblätter der Jugendform beschränken.

Das Material für die folgende Untersuchung ist in den Gärten nicht schwer zu erlangen. Zu besonderem Danke bin ich Herrn Garteninspektor *Beißner* verpflichtet, der mit großer Liebenswürdigkeit mir *Retinispora*-formen zur

¹⁾ Eine Darstellung des Zusammenhanges der *Retinispora* mit *Thuya* und *Chamaecyparis* liefert *Beißner*, Handbuch der Nadelholzkunde (1891) p. 35.

Verfügung stellte. Dadurch wurden auch bezüglich des Untersuchungsmaterials die diesbezüglichen Arbeiten auf eine gesicherte Grundlage gestellt.

1. *Thuya occidentalis* var. *ericoides* Hort. Blätter 11 mm lang. Der Harzgang beginnt 1 mm unterhalb der Spitze und endet 3 mm über der Insertion. Weite $5\ \mu$. Er liegt unter der Epidermis, welche eine $5\ \mu$ starke Cuticula zeigt. Die $15\ \mu$ starken, hypodermalen Bastzellen bilden noch keine geschlossene Schicht. Hier und da treten sie unter der Epidermis auf und lassen so die spätere Schicht erkennen. Harzgang mit einfacher, unverdickter Parenchymscheide. Das Zuleitungsgewebe enthält Schleimzellen. Die Entwicklung des Palisadenparenchyms beginnt in der Mitte der Blattunterseite und schreitet nach dem durch Bastzellen stark verdickten Rande fort. Der Tracheidensaum bildet keine wurzelförmigen Verdickungen in seinen Zellen aus. Die Spaltöffnungen auf der Oberseite der Nadel sind $32\ \mu$ lang. Bastzellen am Rande des Phloems fehlen.

2. *Chamaecyparis sphaeroidea* var. *ericoides* Beißn. et Hochst. — Blattlänge 5 mm. Der Harzgang beginnt unter der Spitze und durchzieht das Blatt bis zur Insertion. In den jüngeren Blättern fehlt die geschlossene hypodermale Bastschicht. Später erscheint sie mit $11\ \mu$ starken Zellen kontinuierlich und unterbricht den Harzgang. Das palisadenartige Parenchym ist schwach entwickelt. Das Zuleitungsgewebe entbehrt der Schleimzellen. Cuticula $6\ \mu$ dick. Den Harzgang umgibt eine doppelte Reihe noch unverdickter Parenchymzellen. Spaltöffnungen $30\ \mu$ lang, $22\ \mu$ breit. Die Zellen des Tracheidensaaumes besitzen Hoftüpfel ohne Verdickungen. Bastzellen am Rande des Phloems fehlen.

3. *Chamaecyparis pisifera* var. *squarrosa* Beißn. et Hochst. Blattlänge 8 mm. Der Harzgang beginnt 1 mm unter der Blattspitze oder direkt darunter und endet 1 mm über der Insertion. Weite $7\ \mu$. Die $11\ \mu$ dicken, subepidermalen Bastzellen treten nur an den Blatträndern auf. Das Palisadenparenchym hebt sich nicht deutlich

gegen das Zuleitungsgewebe ab. Cuticula $7\ \mu$ dick, Spaltöffnungen $36\ \mu$ lang, $21\ \mu$ breit. Eine Parenchymscheide umgibt den Harzgang. Zellen des Tracheidensaumes mit Hoftüpfeln ohne wurmartige Verdickungen. Bastzellen am Rande des Phloems fehlen.

4. Die Jugendform von *Biota orientalis*, nämlich *Biota orientalis decussata* Beißn. et Hochst. stand mir leider nicht zur Verfügung. Die scharfen Charaktere, welche *Biota orientalis* im Auftreten von Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes und von Bastzellen am Rande des Phloems von den Gattungen *Thuya* und *Chamaecyparis* trennen, dürften sich auch an der Jugendform zeigen. Deutlich würden sie beweisen, daß ein Gattungsunterschied auch anatomisch festzustellen ist unter den Jugendformen, daß es jedenfalls aber falsch ist, die Jugendformen der Gattungen *Thuya* und *Chamaecyparis* zu *Juniperus* oder *Cupressus* zu zählen.

II. Allgemeine Ergebnisse.

Ein Vergleich der Anatomie des Retinisporablattes mit dem Altersblatte von *Thuya* beziehungsweise *Chamaecyparis* lehrt, daß das Retinisporablatt weit weniger xerophile Struktur besitzt, als das Schuppenblatt des Altersstadiums. Berücksichtigt man ferner, daß meine früheren Untersuchungen über die Jugendformen von *Juniperus occidentalis*, *J. Pseudosabina* und *Cupressus funebris* das gleiche Resultat ergeben haben, so lassen sich alle diese Verhältnisse in folgenden Sätzen zusammenfassen.

1. Das schuppenförmige Blatt gewährt für die Entwicklung von Spaltöffnungen weniger Raum als das Nadelblatt, das von der Achse unter kleinerem oder größerem Winkel absteht, während das Schuppenblatt ihr angepreßt ist. Das geht soweit, daß an den Schuppenblättern von *Actinostrobus* und *Fitzroya* die Spaltöffnungen auf die Assimilationsseite d. h. auf die morphologische Unterseite treten.

2. Die hypodermale Bastschicht, welche in den Jugendblättern im allgemeinen noch einen Hohlzylinder bildet, verschwindet auf der Oberseite in dem Maße, als das Blatt allmählich an den Zweig sich anlegt. Damit ist aber eine Reduktion des Palisadengewebes verbunden, welches dem hypodermalen Bast gewöhnlich folgt.

3. Die Epidermiszellen der schuppenförmigen Folgeblätter zeigen an jenen Stellen, wo sie sich an den Stamm anlehnen oder mit einem anderen Blatte decken, aber auch da, wo der freie Teil des Blattes sich allmählich vom Stamme trennt, jene Vorwölbungen an der Außenseite, die bereits früher (S. 3) Erwähnung fanden. Den Nadelblättern dagegen fehlen sie.

4. Die hypodermale Bastschicht ist in den Jugendblättern noch nicht so stark entwickelt. Bei den Jugendformen von *Thuya* und *Chamaecyparis* fehlt sie bis auf die beiden Blattränder. Es treten aber einzelne Bastzellen zerstreut unter der Epidermis auf, welche jene Schicht andeuten.

5. Endlich liegt der Harzgang immer subepidermal in den Primordialblättern, selbst da, wo er in den älteren Blättern am Gefäßbündel auftritt (z. B. *Chamaecyparis*).

Das wichtigste Moment scheint die Reduktion des Transpirationsapparates zu sein, indem der Raum für die Spaltöffnungen verringert wird. Denn wenn bei *Juniperus* Sekt. *Sabina* die Jugendblätter zum Teil schon schuppenförmige Anpassung zeigen, so fallen für diese eine Reihe der eben erwähnten Unterschiede hinweg, die für die nadelförmigen Blätter allgemein gelten. Dagegen suchen auch bei dieser Sektion die Blätter in ihrem Alter durch das Anlehnen und weiteres Anwachsen an den Zweig sich gegen Transpiration zu schützen. Andererseits fällt *Juniperus* Sekt. *Oxycedrus* aus dem Rahmen dadurch, daß hier nur Nadeln entwickelt werden. Diese hebt sich aber auch in verschiedenen anderen Eigenschaften aus der Gattung scharf ab. Wie wir oben sahen, tragen die Jugendblätter den Harzgang hypodermal, während er in den schuppenförmigen Blättern an das Gefäßbündel heranrückt. Ver-

gleichen wir nun die Gattungen mit einander, so haben wir in jenen Cupressineen, welche den Sekretbehälter tief im Parenchym tragen, die vor uns, welche zugleich keine Jugendblätter mehr ausbilden. Dagegen gliedern die Vertreter der Gattungen *Thuja*, *Cupressus*, *Juniperus* noch solche aus. Zu der zweiten Gruppe zählt allerdings noch *Chamaecyparis*, die Gattung, bei welcher der Harzgang in den Folgeblättern sich dem Gefäßbündel nähert, während er in den Jugendblättern hypodermal liegt.

Abgesehen von diesen eben erörterten Unterschieden, welche mit der morphologischen Umgestaltung der Nadel zur Schuppe eng verbunden sind, ergibt sich noch ein anderes wichtiges Resultat. Die anatomischen Gattungscharaktere, welche für die Altersblätter gelten, finden sich auch in den Jugendblättern ausgesprochen, so daß es demnach auf anatomischer Grundlage gelingt, die Jugendform auf die zugehörige Gattung zurückzuführen. Freilich dürfte die Unterscheidung der beiden oben besprochenen Retinisporaformen von *Chamaecyparis* anatomisch sich schwer durchführen lassen, d. h. die Unterscheidung der Arten innerhalb der Gattung ist nicht möglich.

II. Beziehungen der Anatomie zur Morphologie.

I. Inwieweit unterstützt die Anatomie die auf Grund der Morphologie getroffene Unterscheidung der Gattungen.

Die Frage, ob die Gattungen der Cupressineen in ihrer heutigen Umgrenzung auch auf anatomischer Grundlage sich unterscheiden lassen, kann bis auf wenige Ausnahmen bejaht werden. Vorausgeschickt muß werden, daß die beiden Gattungen *Juniperus* und *Biota* anatomisch sich nicht unterscheiden lassen.

*Eichler*¹⁾ zieht in den „Natürlichen Pflanzenfamilien“ die Gattungen *Biota* und *Thuja* zusammen, und ihm

¹⁾ A. W. Eichler in A. Engler und K. Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig (1889). Teil II. 1. Abth. p. 98.

folgen manche neuere Systematiker, während *Beißner*¹⁾ die *Endlicher*'sche Gattung als selbständiges monotypes Genus aufrecht erhält. In diesen Widerstreit der Ansichten spricht die Anatomie zu Gunsten der generischen Abtrennung von *Biota* und *Thuja*; denn *Thuja* besitzt nur Hoftüpfel in den Zellen des Tracheidensaumes, während *Biota* noch wurzelförmige Fortsätze an den Hoftüpfeln aufzuweisen hat. Außerdem besitzt *Biota* noch Bastzellen am Rande des Phloems, deren *Thuja* im Blatte entbehrt.

Die Gattung *Libocedrus* bietet für die Systematik nicht unerhebliche Schwierigkeiten dar. Schon *Eichler*²⁾ und andere heben hervor, daß es sich um keine sehr natürliche Gattung handelt. Dazu kommt die große Verbreitung der Arten und ihre Hauptentwicklung auf der südlichen Hemisphäre. Es wachsen

in Chile: *L. tetragona* Endl., *L. chilensis* Endl.

in Neu-Caledonien: *L. austrocaledonia* Brongn. et Gris.

in Neu-Seeland: *L. Doniana* Endl., *L. Bidwilli* Hook. f.

in Neu-Guinea: *L. papuana* F. v. Muell.

Demgegenüber besitzt das pacifische Nordamerika eine Art, *Libocedrus decurrens* Torr., und in der chinesischen Provinz Yun-nan wächst *Libocedrus macrolepis* Benth. et Hook.

Die von *Bentham und Hooker*³⁾ gemachte und in die *Natürlichen Pflanzenfamilien*⁴⁾ aufgenommene Angabe, daß eine Art in Japan wachse, konnte ich aus der Literatur nicht bestätigen. Die älteren japanischen Floren kennen eine Art dieser Gattung nicht. Erst *Matsumura*⁵⁾ erwähnt *Libocedrus macrolepis* auch von Formosa, aber nicht aus dem eigentlichen Japan.

1) *L. Beißner*, l. c. p. 9.

2) *A. W. Eichler*, in *Engler und Prantl*, l. c. p. 96.

3) *G. Bentham et J. D. Hooker*, *Genera plantarum* Bd. 3. p. 426.

4) *Engler u. Prantl*, l. c. p. 96.

5) *J. Matsumura* *Index plantarum Japonicarum Tokioni* I (1905).

Schon *C. Koch*¹⁾ und *S. Kurz*²⁾ betonen die Verschiedenheit der beiden Arten der nördlichen Hemisphäre von den Spezies der südlichen Halbkugel, indem auf *Libocedrus decurrens* die Gattung *Heyderia* und auf *Libocedrus macrolepis* die Gattung *Calocedrus* begründet wird. Die morphologischen Unterschiede gegenüber *Libocedrus* beschränken sich freilich nur auf die abweichende Ausbildung der inneren Zapfenschuppen. Berücksichtigt man aber, daß nach meinen Untersuchungen *Libocedrus decurrens*, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, von den übrigen Arten anatomisch erheblich abweicht, so gewinnen jene morphologischen Differenzen an Wert, und man wird vielleicht mit Recht *Libocedrus decurrens* und *L. macrolepis* als Gattung *Heyderia* den echten *Libocedrus*-Arten gegenüberstellen können. Beide Gattungen sind dann auch pflanzengeographisch umgrenzt.

Nach diesen Auseinandersetzungen stellt sich eine auf anatomischer Grundlage aufgestellte Tabelle der Unterschiede, wie folgt:

	Nur Hoft- äpfel	Hoftäpfel mit Ver- dickun- gen	Harzg. sube- pideral	Harzg. tief	Bast- zellen am Phloem- rande
<i>Actinostrobus</i> ..		+		+	+
<i>Callitris</i>		+		+	+
<i>Fitzroya</i>	+			+	
<i>Thuyopsis</i>	+		+		
<i>Libocedrus</i>	+			+	+
<i>Heyderia</i>		+		+	+
<i>Thuya</i>	+		+		
<i>Biota</i>		+	+		+
<i>Cupressus</i>		+	+		
<i>Chamaecyparis</i> . .	+			+	
<i>Juniperus</i>		+	+		+

¹⁾ *K. Koch*, Dendrologie. Erlangen (1873), p. 179.

²⁾ *S. Kurz*, in Trim. Journ. Bot. 1873, 196 t. 133.

Darf nach dem vorangehenden daher der Wert der Anatomie für die Systematik der Cupressineen nicht unterschätzt werden, so muß eine zweite Frage noch entschieden werden, ob die anatomisch umgrenzten Gattungen sich in natürlicher Weise zu Subtribus anordnen. Unter Aufrechterhaltung der Gattungen Heyderia und Biota gliedern sich bei *Eichler*¹⁾ die Cupressineen in folgender Weise:

Actinostrobinæ.

Actinostrobus, Callitris, Fitzroya.

Thuyopsidinae

Thuyopsis, Libocedrus, Heyderia, Thuya, Biota.

Cupressinae.

Cupressus, Chamaecyparis.

Juniperinae.

Juniperus.

Ein Vergleich mit der oben gegebenen Tabelle lehrt, daß eine Übereinstimmung zwischen dieser und dem *Eichler*'schen System nicht gewonnen werden kann. Auch jede andere Art der Gruppierung nach anatomischen Gesichtspunkten würde das gleiche negative Resultat ergeben. Zwar kommen bisweilen morphologisch verwandte Gattungen neben einander zu stehen, aber eine vollständige Übereinstimmung ist nicht zu erzielen. Dem gegenüber muß freilich darauf hingewiesen werden, daß die morphologischen Unterschiede zwischen den Subtribus der Cupressineen nur geringfügig sind.

II. Gliedern sich die Arten innerhalb der Gattungen in natürlicher Weise?

Von den zehn Gattungen der Cupressineen haben nur drei eine weitere morphologische Einteilung in Sektionen erfahren. Die Gattungen Biota, Thuyopsis besitzen jede nur eine Art, Actinostrobus und Fitzroya deren nur zwei. Die Arten von Cupressus, Chamaecyparis

¹⁾ A. W. Eichler in A. Engler und K. Prantl, l. c. p. 92. ff.

und *Libocedrus* stehen einander morphologisch so nahe, daß eine Verteilung auf verschiedene Sektionen unmöglich wird. Der Betrachtung der Gattungen *Juniperus*, *Callitris* und *Thuya*, deren Arten morphologisch sich gliedern, sei ein auf anatomischer Grundlage aufgestellter Bestimmungsschlüssel von *Cupressus* und *Chamaecyparis* vorausgeschickt.

Cupressus.

A) Stereiden treten auf.

Cupressus Benthami, *C. Goveniana*.

B) Stereiden fehlen.

a) Harzgang länger als $\frac{1}{2}$ mm und gangartig.

C. Macnabiana, *C. torulosa*, *C. funebris*.

b) Harzgang kürzer als $\frac{1}{2}$ mm, Drüse.

C. macrocarpa, *C. thurifera*, *C. glauca*.

Chamaecyparis.

A) Zweige dorsiventral.

a) Seitliche Harzgänge fehlen.

Ch. pisifera.

b) Seitliche Harzgänge treten auf.

Ch. nutkaensis.

B) Zweige bilateral.

a) Seitliche Harzgänge fehlen.

Ch. Lawsonia, *Ch. sphaeroidea*.

b) Seitliche Harzgänge treten auf.

Ch. obtusa.

Juniperus.

Die anatomische Untersuchung ergibt in Übereinstimmung mit der Morphologie die Trennung der Gattung *Juniperus* in die drei Sektionen *Sabina*, *Oxycedrus*, *Caryocedrus*. *Juniperus drupacea* ist der einzige Vertreter der Sektion *Caryocedrus*. Diese ist anatomisch durch das Auftreten eines sehr starken Bastbelages am Phloemrande charakterisiert. Die Anzahl der Bastfasern steigt bis auf zwanzig, während sie bei allen anderen *Juni-*

perus-Arten höchstens zwölf erreicht. Dazu tritt ein zweites Moment. Die wurzelförmigen Verdickungen in den Zellen des Tracheidensaumes enden in seitlichen, nach dem Ende zugespitzten Verzweigungen.

Die Sektion Sabina bildet im Gegensatze zu Caryocedrus nur wenige, die Zahl fünf nicht übersteigende Bastzellen am Rande des Phloems aus. Sie sind in einer Querzone auf dem Blattquerschnitt angeordnet. Der Harzgang erreicht ungefähr die halbe Blattlänge und eine große Weite von über 100 μ . Die Cuticula ist durchschnittlich nicht stark entwickelt, ebensowenig wie die hypodermale Bastschicht. Beide werden meist nicht mehr wie 12 μ dick.

Besonders scharf hebt sich die Sektion Oxycedrus von den Sektionen Sabina und Caryocedrus ab. Morphologisch schon getrennt durch die Nadelblätter, welche auch im Alter ihre Form beibehalten, trägt dieser Änderung auch die Anatomie Rechnung. Früher wurde bereits die rundliche Form der Zellen des Zuleitungsgewebes als besonderes Charakteristikum für die Vertreter dieser Sektion angegeben. Dazu tritt noch die Gestalt des Harzganges. Der Sekretbehälter wird lang, mit nur engem Kanal, dessen Weite unter 100 μ liegt. Das ganze Blatt durchzieht er bis zur Insertion, bei *J. communis* setzt er sich sogar im Zweige fort. Seine Längenausdehnung übertrifft also die des Sekretbehälters der Arten der Sektionen Sabina und Caryocedrus. Die Cuticula und die Zellen der hypodermalen Bastschicht sind durchschnittlich stärker, meist über 15 μ dick entwickelt. Wenn diese Differenzen einen großen Unterschied zwischen der Sektion Sabina und Caryocedrus erweisen, so zeigt die Ausbildung der Anzahl der Bastelemente am Rande des Phloems, daß die Sektion Sabina und Caryocedrus die Extreme darstellen, in deren Mitte Oxycedrus steht. Die erwähnten Zellen treten in den Grenzen von fünf bis zwölf auf und bilden 2 Reihen im Querschnitt. Das Vorangehende läßt sich in folgendem Schlüssel zusammenfassen:

- A) Am Rande des Phloems treten weniger als 5 Bastzellen auf.
- a) Steinzellen werden entwickelt.
J. phoenicea, *J. procera*, *J. macropoda*.
 - b) Steinzellen fehlen.
 - a) Mehr als 3 Bastzellen sind vorhanden.
J. mexicana, *J. chinensis*, *J. virginiana*, *J. occidentalis*.
 - b) 3 oder weniger Bastfasern sind da.
J. recurva, *J. pseudosabina*, *J. davurica*, *J. foetidissima*, *J. thurifera*, *J. sabina*, *J. excelsa*, *J. pachyphlaea*.
- B) Mehr als 5 Bastzellen in mehreren Querreihen.
- a) Mittelrippe schwach, ohne hypodermalen Bast.
 - a) Spaltöffnungsband eingesenkt.
J. rigida.
 - b) Spaltöffnungsband nicht eingesenkt.
J. nana, *J. communis*.
 - b) Mittelrippe mit hypodermalem Bast.
 - a) Xylemrand mit Bastfasern. *J. macrocarpa*.
 - b) Xylemrand ohne Bastfasern.
J. cedrus, *J. oxycedrus*.
- C. Mehr als 15 Bastfasern treten auf und bilden eine dicke Scheide. *J. drupacea*.

Callitris.

Die morphologische Differenzierung der Gattung *Callitris* in die vier Sektionen ist auf die Blattzahl im Quirl begründet. Mir standen zur Untersuchung nur Vertreter der drei Sektionen *Hexaclinis*, *Pachylepis* und *Eucallitris* zur Verfügung.

Die Sektion *Eucallitris* mit der einzigen Art *Callitris quadrivalvis* tritt durch die Ausbildung von Querbalken in den Tracheidensaumzellen in Gegensatz zu allen übrigen Vertretern der Gattung *Callitris*. Wenn auch die Blätter von *Callitris Balansae* und *C. robusta* dieselbe Erscheinung in den Tracheiden des Gefäßbündelsaumes zeigen, so ist sie bei ihnen nur höchst selten, während die zapfen-

artigen Vorsprünge vorherrschen. *C. quadrivalvis* aber zeigt die ganze Zelle mit Querleisten durchsetzt.

Die australische Sektion *Hexaclinis* unterscheidet sich von der afrikanischen *Pachylepis* durch Entwicklung einer Parenchym Scheide um Harzgang und Gefäßbündel. Außerdem wird der Harzgang länger und der Innenraum dehnt sich weiter aus. Die Längenausdehnung schwankt in den Grenzen von 1 und 2 mm bei den Arten der Sektion *Hexaclinis*. Die Vertreter von *Pachylepis* bilden den Sekretbehälter kürzer als 1 mm aus. Wenn diese Unterschiede auch geringfügig sind, so stehen sie doch im Einklange mit der morphologischen Gliederung der Gattung.

Callitris Macleyana F. v. Muell., der einzige Vertreter der Sektion *Octoclinis*, lag nicht zur Untersuchung vor.

Die anatomische Gliederung läßt sich in folgendem Schlüssel kurz zusammenfassen:

A) Stereiden treten auf.

C. iuniperoides, *C. rhomboidea*.

B) Stereiden fehlen.

a) Seitliche Harzgänge fehlen:

C. natalensis, *C. robusta*.

b) Seitliche Harzgänge treten auf:

C. quadrivalvis, *C. Balansae*.

Thuya.

Wie früher bereits näher ausgeführt wurde, ist die Gattung *Biota* als selbständiges Genus von *Thuya* abzutrennen. Die vier übrig bleibenden Arten verteilt *Beißner*¹⁾ mit *Bentham und Hooker*²⁾ in die beiden Sektionen *Euthuya* Benth. et Hook. und *Macrothuya* Benth. et Hook.

Thuya Standishi Carr. und *Thuya gigantea* Nutt. aus der Sektion *Macrothuya* weisen größere Harzgänge

¹⁾ L. Beißner l. c. p. 9.

²⁾ G. Bentham et J. D. Hooker l. c. p. 427.

in den Blättern auf. Die Länge übersteigt $\frac{1}{2}$ mm, während die Sektion *Euthuya* sie meist kleiner zeigt. Außerdem ist die Stärke in der Ausbildung der Cuticula in der Sektion *Macrothuya* mit $10\ \mu$ erheblich größer gegenüber $5\ \mu$ bei *Euthuya*. Dagegen zeigt schon die hypodermale Bast-schicht diesen Unterschied nicht, ebenso wie die übrigen Elemente des Blattes gleich gebaut sind. Anatomisch gliedert sich also *Thuya* wie folgt:

A) Seitliche Harzgänge treten auf.

a) Stereiden sind entwickelt.

Th. *Standishi*.

b) Stereiden fehlen.

Th. *occidentalis*, Th. *gigantea*.

B) Seitliche Harzgänge fehlen.

Th. *plicata*.

III. Welche Verschiedenheiten bestehen zwischen den Varietäten einer Art untereinander?

Aus den Gattungen *Thuya*, *Chamaecyparis* und *Juniperus* werden in den Gartenanlagen einzelne Arten in Kulturrassen gezogen, die sich durch Wuchs und Farbe der Blätter von einander unterscheiden. Daran knüpft sich die Frage, ob solche Varietäten von dem Typus der Art sich anatomisch unterscheiden lassen. Von vornherein wird man erwarten dürfen, daß Unterschiede, wenn sie überhaupt vorhanden sind, nur innerhalb enger Grenzen liegen.

Aus der Gattung *Thuya* wurden folgende Varietäten von *Thuya occidentalis* untersucht: *Thuya occidentalis* var. *aurea* Hort., *Th. occidentalis* var. *recurva nana* Hort., *Th. occidentalis* var. *Howeyi* Hort., *Th. occidentalis* var. *Bodmeri* Hort., *Th. occidentalis* var. *Wareana* Hort.

Von diesen gleicht var. *aurea* bis auf die Farbe der Blätter der Stammform. Var. *recurva nana* ist nur

durch die Dicke der Cuticula von var. aurea und der Stammform verschieden. Die Dicke der Cuticula beträgt $10\ \mu$. Var. Hoveyi zeichnet sich durch den engen Harzgang besonders aus. Die beiden letzten Varietäten var. Bodmeri und var. Wareana entfernen sich am meisten von der Stammform. Sie entbehren fast immer der seitlichen Harzgänge. Von einander lassen sie sich dadurch unterscheiden, daß var. Wareana eine fast doppelt so dicke Cuticula und weiteren Harzgang besitzt. Var. Bodmeri fällt außerdem durch die größeren Spaltöffnungen gegenüber var. Wareana auf.

Aus der Gattung *Juniperus* wurde die anatomische Variabilität von *Juniperus virginiana* und *Juniperus Sabina* studiert.

Von *Juniperus virginiana* wurden *Juniperus virginiana* var. Schottii Hort. und *Juniperus virginiana* var. tripartita Hort. verglichen. Während var. Schottii ganz der Stammform gleicht, zeigt var. tripartita erhebliche Abweichungen. Die Spaltöffnungen erreichen nur $40\ \mu$ Länge gegenüber $51\ \mu$ bei der Stammform. Außerdem zeigt der Rand des Phloems nur 3 Bastzellen, während die Stammform 4 aufweist. Die Varietät entwickelt seitliche Harzgänge nicht, wohl aber die Stammform, wenn auch nicht sehr oft.

Juniperus sabina var. tamariscifolia Hort. ist durch die um $20\ \mu$ längeren Spaltöffnungen und die $3\ \mu$ stärkere Cuticula von der Stammform verschieden.

Aus der Gattung *Chamaecyparis* gelangten Varietäten von *Chamaecyparis Lawsonsia* und *Chamaecyparis obtusa* zur Untersuchung.

Von *Chamaecyparis Lawsonsia* wurden berücksichtigt: var. robusta nana Hort., var. erecta viridis Hort., var. gigantea Hort., var. pyramidalis alba Hort. Die Unterschiede zwischen ihnen ergibt am besten nachstehende Tabelle:

	Dicke der Cuticula	Länge des Harzganges.
Stammform	5 μ	500 μ
Ch. L. gigantea	15 μ	240 μ
Ch. L. nana robusta . .	6 μ	130 μ
Ch. L. erecta viridis . .	4 μ	120 μ
Ch. L. pyramidalis alba	5 μ	640 μ
Ch. L. aurea.	11 μ	500 μ

Die Variabilität von *Chamaecyparis obtusa* bewegt sich innerhalb weiterer Grenzen, obwohl nur *Chamaecyparis obtusa* var. *lycopodioides* Carr. mit der Stammform verglichen wurde. Die Varietät besitzt gegenüber *Chamaecyparis obtusa* nur einen Harzgang, während jene meist noch zwei seitliche aufzuweisen hat. Er kann bei var. *lycopodioides* sogar ganz fehlen. Außerdem sind die Spaltöffnungen der Varietät breiter entwickelt als die der Stammform.

Lebenslauf.

Am 22. Juli 1880 wurde ich, Alfred Prause, katholischer Konfession, als Sohn des Hausbesitzers Paul Prause zu Reichenstein, Kreis Frankenstein, geboren. Ich besuchte das Gymnasium in Patschkau, Kreis Neisse, das ich Ostern 1902 mit dem Reifezeugnis verließ. Zunächst studierte ich zwei Semester in Breslau katholische Theologie, wandte mich aber später dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaften, speziell der Botanik, zu. In dieser Zeit hörte ich die Vorlesungen folgender Herren Dozenten:

Abegg, Baumgartner, Brefeld, Frech, Gürich, Herz, Kneser, Kückenthal, Lummer, Landsberg, Meyer, Pax, Pringsheim, Rohde, Rosen, Rosanes, Sachs, Schaefer, Stern, Sturm, Volz, Winkler, Zimmer.

Allen meinen hochverehrten Lehrern fühle ich mich für die Förderung meiner Studien zum Danke verpflichtet.

Besonderen Dank schulde ich Herrn Prof. Dr. Pax für die Anregung zu vorliegender Arbeit, aber auch für das Interesse und das Wohlwollen, das er mir während meiner Studienzeit erwiesen hat.

An dieser Stelle danke ich auch Herrn Dr. Lingelsheim und Herrn Privatdozenten Dr. Winkler für die freundliche Unterstützung durch ihren Rat, die ich stets gefunden habe.
